

תרכיז רחוף

קוטל מחלות בתפוחי אדמה וגפן, למניעת מחלות קרקע במלון ותפוחי אדמה ולטיפול מונע בזרעי אגוזי אדמה

Fluazinam.....	החומר הפעיל <
תרכיז רחוף המכיל 500 גרם חומר פעיל בליטר.....	התוארית <
נמוכה.....	רעילות לאדם <
נמוכה.....	מסיסות במים <
ISK - Ishihara Sangyo Kaisha, Japan.....	היצרן <
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 95/הצ/1382.....	מס' הרשוי <

כללי

אוהיו הינו קוטל מחלות מקבוצת הפירידיאמינים, הפועל ע"י עיכוב תהליך זירחון חימצוני בפתוגנים. התכשיר יעיל להדברת טווח רחב של מחלות, באמצעות מניעה יעילה של התפתחות המחלות. אוהיו פעיל על מספר אתרים שונים בפתוגנים ולכן הסיכוי להתפתחות תנגודת לתכשיר הינו מינימלי.



הוראות שימוש

הערות	טיפול עלווה - כמות התכשיר		המחלה	הגידול
	ריסוס עד נגירה (% הריכוז)	נפח התרסיס 40-20 ל"ד' המינון (סמ"ק/ד')		
מטפלים החל מהצצה ולפני הופעת המחלה מידי 7-12 יום בהתאם לקצב הגידול והנגיעות ⁽²⁾	-	50	כמשון ⁽¹⁾	תפוחי אדמה
טיפול מניעה בסוף העונה מידי 7-14 יום. (בבוטריסיס - במיוחד אם צפויים גשמים). הטיפולים ימנעו גם התפתחות ורקבנות במהלך האיחסון.	0.1%	-	בוטריסיס ⁽⁴⁾	גפן ⁽³⁾
	0.1% - לטיפול מניעה, לפני הופעת נגיעות. 0.15% - לטיפול עם תחילת נגיעות וכאשר קיימת סבירות גבוהה לנגיעות.	-	אספרגילוס, ריזופוס	
יש לרסס חודש לפני לבלוב צפוי, לאחר זמירה. מומלץ להשלים בשני ריסוסי מנקו-די, ראשון בראשית לבלוב ושני 10 ימים לאחר מכן.	0.1% בתוספת 2% שמן מינרלי (אולטרה פיין)	-	זרוע מתה	
מוהלים את התכשיר ומגמיעים לפי 0.5-1.0 ליטר/צמח. מיישמים החל משבועיים לאחר שתילה או זריעה ולאחר מכן במרווחים של שבועיים, עד לקטיף.	150 סמ"ק/ד' בהגמעה		מונוספוראסקוס (התמוטטות מאוחרת במלונים)	מלון ⁽⁵⁾ טיפולי קרקע
ריסוס בפס הזריעה, בנפח תרסיס 20 ל"ד'. יש ליישם בשתי דיוות קונג'ט, רוחב פס 30 ס"מ, דיזה ראשונה לאחר פתיחת התלם ושניה על מקום נפילת הפקעות.	500 סמ"ק/ד' ריסוס בפס הזריעה		ריזוקטוניה ⁽⁶⁾	תפוחי אדמה טיפולי קרקע
נפח תרסיס 5 סמ"ק לק"ג זרעים בצפיפות כסוי של כ - 1,200 טיפות/סמ"ר.	טיפול זרעים		אספרגילוס, ריזופוס	טיפול בזרעי אגוזי אדמה בזנים נועם, עודד, שולמית
	טיפול זרעים - ריסוס ULV (בנפח נמוך מאוד) בריכוז 2%			



הערות לטבלה

- (1) טיפולים למניעת כמשון, ימנעו גם חלפת.
- (2) מטפלים החל מהצצה ובעיקר לפני סגירת השורות ולפני הופעת המחלה בתדירות של 12 ימים. עם הופעת המחלה או עליה בקצב הצימוח מצופפים לטיפול כל 7 ימים.
- (3) כרם בזנים: סובינין לבן, שאגן, פרנץ' קולומבר, קברנה, מוסקט סוליטינינה (תומפסון), שרדונה, ברלינקה ושמי (חברוני).
- (4) טיפולים בסוף העונה למניעת בוטריטיס יפחיתו התפתחות כשותית אך לא ידבירו כשותית קיימת.
- (5) במלונים לפני היישום יש להרטיב קרקע ב - 2/3 מכמות השקיה רגילה ולאחריו להשלים את השליש הנותר. יישום אוהיו אינו חלופה לשיטות הדברה חלופיות (מתיל ברומיד, כנות עמידות) וממלך ליישמו בשילוב עם שיטות אלה.
- (6) יעילות מניעת התפתחות קשיונות הריזוקטוניה הינה עד שבועיים ממועד ייבוש העלווה.

שילובים

- תפוחי אדמה** - בריסוסי עלווה ניתן לשלב אוהיו עם טלסטאר בהתאם למינונים המופיעים בתוית של כל תכשיר.
- כרם** - ניתן לשלב אוהיו עם קנון 50 וטרייסר אולטרה.