

ATEMI EXTRA® אטמי אקסטרה

קבוצת FRAC: 3 - השפעה על ביוסינטזת ארגוסטרוליים

תרכיז נוזלי

קוטל מחלות סיסטמי להדברת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה, מטעים, פרחים ותבלינים

.....	Cyproconazole	החומר הפעיל	<
.....	תרכיז נוזלי המכיל 100 גרם חומר פעיל בליטר	התוארית	<
.....	נמוכה	רעילות לאדם	<
.....	בינונית	מסיסות במים	<
.....	Syngenta Crop Protection AG, Switzerland	היצרן	<
.....	רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 1604/הצ/00	מס' הרשוי	<

כללי

אטמי אקסטרה הינו קוטל פטריות סיסטמי השייך למשפחת הטריאזולים. התכשיר פועל על ידי עיכוב הביוסינטזה של הארגוסטרולים בפטריות. התכשיר יעיל נגד מגוון גדול של מחלות בגידולים רבים.



ATEMI EXTRA® אטמי אקסטר

הוראות שימוש

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד') בנפח קטן (עד 100 ל"ד')	הריכוז (%) בריסוס נגירה (מעל 100 ל"ד')	יישום אחרון לפני הקטיפ (ימים)
אגוזי אדמה	צרקוספורה	50-40 ⁽¹⁾	-	40
שום	חלדון	50-40 ⁽²⁾	-	14
	סטמפיליום	50	-	
חמניות	חלדון	50 - בריסוס	-	30
		75 - בהגמעה ⁽⁵⁾	-	
	קמחון	30 - בריסוס	-	
חמצה	חלדון	50-25 - בריסוס	-	60
		75 - בהגמעה ⁽⁶⁾	-	
חיטה	מיני חלדונות (עלה, צהוב, קנה) ספטוריה	40	-	60
פלפל ⁽³⁾ , פפריקה ⁽³⁾ , עגבניה ⁽³⁾ , חציל ⁽³⁾ , בשדה פתוח בלבד	קמחונית	40	0.04	3
מנגו	קמחון	-	0.02	60
תפוח ⁽⁴⁾	קמחון	-	0.03-0.02	45
	גרב	-	0.03	
אפרסק, נקטרינה	חלדון, קמחון	-	0.02	21
שזף יפני, שזף ארופאי	חלדון	-	0.02	21
שקד	חלדון, מוניליה ⁽⁷⁾ , נימשון (פוליסיטיגמה)	-	0.02	21
אורגנו	חלדון	40	-	21
אזוב מצוי (זעתר), לענה דרקונית (טרגון)	חלדון	40	-	17
היפריקום, לימוניום מזן אמילי	חלדון	50	-	-



הערות לטבלה

- (1) מינון נמוך בטיפולי מניעה, מינון גבוה בטיפולי תגובה.
- (2) המינון הגבוה מתייחס לנגיעות בינונית - גבוהה בשום.
- (3) בירקות אין לרסס יותר מריסוס עוקב אחד. **אין לרסס כאשר טמפרטורת לילה יורדת מ 15°C.**
- (4) אין לרסס בראשית העונה כאשר הטמפרטורות נמוכות. בקמחון הריכוז לפי עוצמת הנגיעות.
- (5) יש להזריק אטמי אקסטרה מהול במים למערכת הטיפטוף, **במערכות השקיה מנותקות אויר**, לקראת סוף השקיה רגילה, במשך 30-60 דקות. יש להמשיך ולהשקות עוד כשעה לאחר סיום ההזרקה לשיטת המערכת ולפיזור התכשיר בקרקע. ביישום בהגמעה פעילות התכשיר בצמח מתחילה כשבוע לאחר היישום, לכן יש ליישם כ- 10 יום לפני מועד מומלץ לריסוס. יישום בהגמעה החל משבועיים לאחר פריחה יהיה יעיל פחות ובמקרה כזה מומלץ ריסוס.
- (6) יש להזריק אטמי אקסטרה מהול במים למערכת הטיפטוף, **במערכות השקיה מנותקות אויר**, לקראת סוף השקיה רגילה, במשך 30-60 דקות. יש להמשיך ולהשקות עוד כשעה לאחר סיום ההזרקה לשיטת המערכת ולפיזור התכשיר בקרקע. ביישום בהגמעה פעילות התכשיר בצמח מתחילה כשבוע לאחר היישום ונמשכת למעלה מחודש. יש להקפיד על יישום מוקדם כשרמת החלדון נמוכה, כלומר כתמי מחלה בודדים לצמח. בריסוס, מינון נמוך ברמת נגיעות נמוכה ומינון גבוה בנגיעות גבוהה.
- (7) למניעת מוניליה יש ליישם ריסוס ראשון בשלב פקעים ורודים ולאחר מכן לרסס לפני כל ארוע גשם צפוי.

שילובים

ניתן לשלב אטמי אקסטרה עם התכשירים הבאים, בהתאם למינונים המופיעים בתווית האריזה שלהם:

אגוזי אדמה - פליקטרן.

פלפל - דורסן, טלסטאר, מוליט, ורטימק, אטברון.

עגבניה - טלסטאר, פליקטרן, מוליט, ורטימק, אוונט, אטברון, אפלורד, מוספילן, טרימנגול,

מנקו-די, קליפמן.

חציל - טלסטאר, ורטימק, פליקטרן, אפלורד, טייגר.

תפוח - דורסן, ורטימק, פליקטרן.

אפרסק - מאבריק, סנסור, רוגור.

חמצה (בריסוס) - קנון 50.