

AMID-THIN

אמיד-תין®

אבקה רחיפה לדילול פרי בעצי תפוח

החומר הפעיל	<	Naphtalene Acetamide.....
התוארית	<	אבקה רחיפה המכילה 8.4% חומר פעיל
רעילות לאדם	<	נמוכה.....
מסיסות במים	<	גבוהה.....
היצרן	<	Amvac, USA.....
מס' הרשוי	<	רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 05/הצ/1798

כללי

אמיד-תין מווסת צימוח לשימוש כמדלל פריחה בתפוח. התכשיר מיועד לריסוס עד שבועיים לאחר שיא פריחה וגורם לנשירת חלק מן החנטים הצעירים ולהקלה בעומס הפרי. אמיד-תין נקלט ע"י חלקי הצמח הירוקים כל עוד הם רטובים, לכן עדיף לרסס בנפח תרסיס גבוה בשעות שהלחות גבוהה לאורך זמן - בוקר מוקדם או לילה. בתנאי יובש או שרב קליטת החומר פחותה. במקרים של פריחה לא אחידה (לפי קומות) ניתן לבצע ריסוס נוסף המכוון לצמרות במועד המתאים לפי נשירת עלי כותרת. יש להקפיד ולא להשתמש במינונים גבוהים מדי אשר יגרמו לדילול יתר.

הוראות שימוש

בקביעת המינון יש להביא בחשבון את הזן, עצמת הפריחה, מצב העצים, כנה, וגורמים נוספים הקשורים לעצים, לחלקה ולמזג האויר בעת הריסוס ובימים שאחרי.

הערות	מועד הטיפול	מינון בגרם תכשיר ל- 1000 ליטר מים	ריכוז חומר פעיל מוקק	הזן
לפריחה בינונית אחידה	10-3 ימים לאחר שיא פריחה (2)	600-720 גרם + משטח (1)	60-50	זהוב
המינון המומלץ לפריחה ממושכת הבאה בגלים ומתמקדת בקומות. כל ריסוס מופנה לקומת הפריחה. שבוע לפחות בין הריסוסים.	10-3 ימים לאחר שיא פריחה בכל קומה	360-480 גרם + משטח (1)	40-30	
לפריחה שופעת	10-3 ימים לאחר שיא פריחה	960 גרם + משטח (1)	80	
לפריחה בינונית-שופעת. הפרי קטן מטבעו ולכן יש לדלול מוקדם ככל האפשר. אם חוששים מדילול יתר יש לרדת למינון הנמוך.	7-3 ימים לאחר שיא פריחה	480-600 גרם + משטח (1)	50-40	יונתן
לפריחה בינונית	7-3 ימים לאחר שיא פריחה	480-720 גרם + משטח (1)	60-40	גלה
לפריחה שופעת		720-960 גרם + משטח (1)	80-60	
לפריחה שופעת	14-10 ימים לאחר שיא פריחה	420-480 גרם + משטח (1)	40-35	גרני סמיט

הערות לטבלה

- משטח טריטון 100 - x בריכוז 0.025% (250 סמ"ק משטח ל- 1000 ליטר מים). מרססים בנפח מלא 200-300 ליטר/דונם עד נגירה. במצב שבו מרססים רק חלקי עץ, מפחיתים את כמות התרסיס בהתאם.
- שיא פריחה - המצב בו באותה "קומה" 80% מן הפרחים פתוחים, 10% סגורים, ו- 10% מן הפרחים כבר השירו את עלי הכותרת.

הערות

- גשם היורד מיד לאחר הריסוס עלול לגרום לדילול יתר. בכל מקרה של התלבטות ביחס לקביעת מינון לטיפול, בחר בריכוז הנמוך (לשם ביטחון). אם הדילול אינו מספק ניתן לדלל מאוחר יותר בתכשירים נוספים או לדלל ידנית.
- לקביעת המינון המדויק, מתוך תחום המינונים שבתווית, מומלץ להתייעץ עם מדריך מנוסה.