

אבקה מסיסה בשקיות מסיסות

קוטל עשבים רחבי עלים בחיטה, בשיבולת שועל, במטע ובשטחי בור.

Dimethylamine salt of 2,4-D	החומר הפעיל	<
אבקה מסיסה המכילה 96.9% חומר פעיל, מתאים ל 80% 2,4-D	התאורית	<
נמוכה	רעילות לאדם	<
גבוהה	מסיסות במים	<
Nufarm, Australia	היצרן	<
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 01/הצ/1643	מס' הרשוי	<

כללי

אמינובר הינו קוטל עשבים בררני, סיסטמי, מקבוצת תרכובות הפנוקסי ומיועד להדברת עשבים רחבי עלים בחיטה ובשבולת שועל, במטעים ובשטחי בור. התכשיר נקלט ע"י כל חלקי הצמח, פועל בדומה לאוקסינים ופוגע בתהליכים רבים בצמח. אמינובר ארוז בשקית אלומיניום ובה שקית פנימית נוספת מסיסה, אותה ניתן להכניס עם התכשיר למיכל המרסס.

הדברת עשבים:

התכשיר מדביר עשבים רחבי עלים חד-שנתיים ממשפחות שונות כגון: מצליבים, סילקיים, מורכבים ועוד. אמינובר מסייע בקטילת עשבים קשי הדברה במטעים ובשטחי בור כאשר הוא משולב עם גלייפוס.



הוראות שימוש בגידולים דגניים

מועד הריסוס	נפח התרסיס (ל'ד')	המינון (גר'ד')	הגידול
עם סיום התמינות השבולת (לאחר הופעת 6 עלים והתארכות פרק ראשון) ועד לשבועיים לפני השתבלות (4)	מהקרקע: 15-25 מהאוויר: 3-5 (3)	90	חיטה (1) שבולת שועל (2,1)

הערות לטבלה

- אין להכניס בעלי חיים לשטח המרוסס במשך 7 ימים. אין לרסס חיטה ושבולת שועל במצב עקה. עקת יובש לפני ואחרי הריסוס עלולה לגרום לפגיעה בגידול. בזמן הריסוס עתודות המים בקרקע צריכות להספיק ל - 3 שבועות.
 - שבולת שועל לשחת בלבד מזנים סאיה 4, סאיה 6.
 - ריסוס אוירי מותנה באישור השירותים להגנת הצומח ולבקורת.
 - סימן המדויק ביותר לקביעת מועד הריסוס המוקדם ביותר הוא סיום התמינות השבולת. ניתן לזהות זאת באמצעות חתך אורך בבסיס הצמח. יש להמנע מריסוס מוקדם מדי, בייחוד בזנים אפילים כגון אריאל. בשבולת שועל יש להקפיד שגם הסעיפים הצעירים ביותר בני 6 עלים.
- הערה:** אין לשלב עם דשן אוראן מחשש להתגבשות.

הוראות שימוש במטע ובשטחי בור

הערות	העשבים המודברים	נפח התרסיס	הריכוז/המינון	הגידול
יש להקפיד לרסס בתנאים נאותים של העדר רוח וטמפרטורות מתונות. המנע מפגיעת תרסיס בחלקי הצמח הירוקים כולל סורים (חזירים). המנע מריסוס בעת הפריחה. הזהר מפגיעה בגידולים שכנים.	חד ורב שנתיים, חורפיים וקיציים	30 ל'ד' בריסוס באמצעות מוט ריסוס	0.25% בשילוב עם גלייפוס 1%	הדרים, נקטרינה, אפרסק, שזף, שקד, תפוח, מנגו, זית, רימון, אבוקדו, משנה שלישית לנטיעה
		עד הרטבה מלאה באמצעות רובים או מרססי גב		
כשהגידול בגובה 30-40 ס"מ בריסוס מכוון ומתחת לנוף הגידול	עשבי קיץ רחבי עלים	20-30 ל'ד'	ריסוס מכוון ומגון (1) במינון 120 גר'ד'	סורגום
יש לרסס בתנאים של העדר רוח ולהזהר מפגיעה בגידולים חקלאיים סמוכים	חד ורב שנתיים, חורפיים וקיציים	30 ל'ד' ומעלה, כדרוש לכיסוי מיטבי של העשבייה	0.25%-0.5% (2) בשילוב עם גלייפוס 1%-3%	שטחי בור וצידי דרכים

הערות לטבלה

- מוגן - הגנה על הסורגום מפני רחף של התכשיר באמצעות מגינים על הפומיות או על הגידול.
- הריכוז יקבע בהתאם למגוון וגובה העשבים.

