

קבוצת IRAC: 3A - משבשי פעילות של תעלות נתרן
+ קבוצת IRAC: 28 - משבשי פעילות של קולטני RYANODINE

שילוב של תרחיף קפסולות ותרכיז רחיף (ש.ת.ר. ZC)

קוטל חרקים בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים

Chlorantraniliprole (CTPR) + lambda-cyhalothrin	החומר הפעיל	<
שילוב של תרחיף קפסולות ותרכיז רחיף המכיל	התוארית	<
100 גרם CTPR ו-50 גרם למבדה-סייהלוטרין בליטר		
נמוכה	רעילות לאדם	<
גבוהה	מסיסות במים	<
Syngenta Crop Protection AG, Switzerland	היצרן	<
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 11/הצ/4091	מס' הרשוי	<

כללי

אמפליגו הינו קוטל חרקים המכיל שני חומרים פעילים, האחד פירתרואיד (למבדה סייהלוטרין), בעל פעילות קטילה מהירה היעיל בהדברת עשים ומגוון רחב של מזיקים והשני (CTPR) הוא חומר פעיל חדש המצטיין בהדברת עשים, חיפושיות ותרופסים והינו בעל יכולת תנועה סיסטמית בקסילם. CTPR פעיל על דרגות הזחל השונות כולל הביצים. תוארית התכשיר קפסולרית, ובכך נמנע פירוק התכשיר במיכל, ומופחת למינימום הגירוי והרעילות במגע עם התרסיס. התערובת של שני חומרים פעילים מפחיתה את הסיכון של פיתוח עמידות ומאפשרת יישום חוזר ללא חשש מכך. אין ליישם אמפליגו לקרקע בכמיגציה (בהגמעה או דרך מערכת השקיה מנותקת אויר). בעת הריסוס יש לשמור על מרחק בטחון ממקורות מים.

שילובים

ניתן לשלב אמפליגו עם התכשירים הבאים, בהתאם לגידולים:

- עגבניה** - פיראט, מטרונום.
- זר** - בראבו.
- כרוביים** - טלסטאר, מטרונום.
- גפן** - דומארק, קנון.
- מלפפון** - מטרונום, פיראט, דומארק, קוסמוס, סכור, גלבן מנקוזב, דאקוניה.
- אגוזי אדמה** - בראבו, אטמי אקסטרה.
- פלפל** - פריורי אקסטרה.
- רימון** - הרקולס.
- חמניה** - פריורי אקסטרה



הוראות שימוש

יישום אחרון לפני הקטיף (ימים)	המינון (סמ"ק/ד') הריכוז (%)	המזיק	הגידול
3	20 ביישום להדברת טוטה יש לשלב עם מטרונם 0.5% EOS או 0.5%	הליותים, פלוזיה, מנהרן החממות ⁽²⁾ , טוטה אבסולוטה, אגרוטיס ⁽³⁾	עגבניה ⁽¹⁾
3	20	לפיגמה, הליותים, פרודניה	פלפל
10			פפריקה
3	20	מנהרן החממות	מלפפון, קישוא, מלון
3	20	עש לב הכרוב, עש הכרוב, תריפס הטבק, פרודניה, לפיגמה	כרוב (אדום, לבן), כרובית, ברקולי
3	20	פרודניה, לפיגמה	חסה
8	20	פרודניה, לפיגמה, אגרוטיס ⁽³⁾	תפוח אדמה
8	20	פרודניה, לפיגמה	בטטה
14	40 - 20	מלדרה, דופונצ'ליה	בטטה ⁽⁴⁾
14	20	לפיגמה, פרודניה	גזר
30	20	תריפס הטבק, אגרוטיס ⁽³⁾	בצל
14	20	הליותים, אגרוטיס ⁽³⁾	כותנה
30	20	מלדרה	אגוזי אדמה ⁽⁵⁾
30	20	הליותים, אגרוטיס ⁽³⁾	חמניות ⁽⁶⁾
	10	תריסית ירוקה, תריסית הצלף	
7	20	הליותים, נובר התירס האירופי, נובר הקנה המנוקד ⁽⁷⁾ , אגרוטיס ⁽³⁾	תירס מתוק, תירס מספוא
40	0.02%	עש היסמין	זית
8	0.02%	עש האשכול	גפן
7	0.02%	אנרסיה, עש החרוב	שקד
7	0.02%	אנרסיה	אפרסק, נקטרינה, משמש
14	0.02%	כחליל הרימון	רימון
-	20	לפיגמה	פרחים ⁽⁸⁾ : גיבסנית, ליזאנטוס, נורית, כלנית, נץ הלב, סולידגו



הערות לטבלה

- (1) בעגבניות יש להוציא את כוורות הבומבוס לפני הריסוס ולהחזירן 24 שעות לאחר הריסוס.
- (2) בעגבניות - להדברת מינהרן החממות, מומלץ לשלב עם מטרונום 0.5%.
- (3) להדברת אגרוטיס יש ליישם בריסוס שטח מלא בסמוך להצצה. מומלץ להמטיר 15 קוב/ד' בתוך 12 שעות מהיישום.
- (4) יש לרסס החל מ-2 - 3 שבועות לאחר שתילה במינון 20 סמ"ק/ד' כל שבועיים או במינון 40 סמ"ק/ד' כל 4 שבועות. מומלץ לבצע אלטרנציה ולהתחיל מעקובת טיפולים ביישום טלסטאר בגלל פעילותו השאריתית בקרקע. יש להמטיר לאחר יישום התכשיר.
- (5) באגוזי אדמה - מועדי היישום ותדירות הטיפולים עפ"י תוכנית הטיפולים המומלצת בהתאם להופעת המזיק, לעוצמת הנגיעות ולמשך הדור. יש לשלב במעקובת הטיפולים תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר, כדי למנוע התפתחות/התבססות של עמידות.
- (6) להבטחת היעילות יש להקפיד על נפח תרסיס גבוה (15 ל"ד') וכיסוי מיטבי.
- (7) להדברת נובר הקנה המנוקד, מומלץ לשלב עם מתומקס או לאנט.
- (8) זני פרחים שניבדקו: גבסנית - מירבלה, מיליון סטאר, פרפקטה, ליזיאנטוס - פרטי (ורוד), רוזיטה (לבן), קזבלנקה, נורית - פרנס מנדרין, נץ חלב - דוביום אורנג', סולידגו - גלורי.