

קבוצת IRAC: 3A - משבשי פעילות של תעלות נתרן  
+ קבוצת IRAC: 28 - משבשי פעילות של קולטני RYANODINE

## שילוב של תרחיף קפסולות ותרכיז רחיף (ש.ת.ר. ZC)

קוטל חרקים בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים

Chlorantraniliprole (CTPR) + lambda-cyhalothrin	החומר הפעיל	<
שילוב של תרחיף קפסולות ותרכיז רחיף המכיל	התוארית	<
100 גרם CTPR ו-50 גרם למבדה-סייהלוטרין בליטר		
נמוכה	רעילות לאדם	<
גבוהה	מסיסות במים	<
Syngenta Crop Protection AG, Switzerland	היצרן	<
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 11/הצ/4091	מס' הרשוי	<

### כללי

אמפליגו הינו קוטל חרקים המכיל שני חומרים פעילים, האחד פירתרואיד (למבדה סייהלוטרין), בעל פעילות קטילה מהירה היעיל בהדברת עשים ומגוון רחב של מזיקים והשני (CTPR) הוא חומר פעיל חדש המצטיין בהדברת עשים, חיפושיות ותרופסים והינו בעל יכולת תנועה סיסטמית בקסילם. CTPR פעיל על דרגות הזחל השונות כולל הביצים. תוארית התכשיר קפסולרית, ובכך נמנע פירוק התכשיר במיכל, ומופחת למינימום הגירוי והרעילות במגע עם התרסיס. התערובת של שני חומרים פעילים מפחיתה את הסיכון של פיתוח עמידות ומאפשרת יישום חוזר ללא חשש מכך. אין ליישם אמפליגו לקרקע בכמיגציה (בהגמעה או דרך מערכת השקיה מנותקת אויר). בעת הריסוס יש לשמור על מרחק בטחון ממקורות מים.

### שילובים

ניתן לשלב אמפליגו עם התכשירים הבאים, בהתאם לגידולים:

- עגבניה** - פיראט, מטרונום.
- זר** - בראבו.
- כרוביים** - טלסטאר, מטרונום.
- גפן** - דומארק, קנון.
- מלפפון** - מטרונום, פיראט, דומארק, קוסמוס, סכור, גלבן מנקוזב, דאקוניה.
- אגוזי אדמה** - בראבו, אטמי אקסטרה.
- פלפל** - פריורי אקסטרה.
- רימון** - הרקולס.
- תמניה** - פריורי אקסטרה



הוראות שימוש

הנידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד') הריכוז (%)	יישום אחרון לפני הקטיף (ימים)
עגבניה (1)	הליותיס, פלודה, מנהרן החממות (2), טוטה אבסולוטה	20	3
פלפל	לפיגמה, הליותיס, פרודניה	20	3
פפריקה			10
מלפפון, קישוא, מלון	מנהרן החממות	20	3
כרוב (אדום, לבן), כרובית, ברקוני	עש לב הכרוב, עש הכרוב, תריפס הטבק, פרודניה, לפיגמה	20	3
חסה	פרודניה, לפיגמה	20	3
תפוח אדמה	פרודניה, לפיגמה, אגרוטיס (3)	20	8
בטטה	פרודניה, לפיגמה	20	8
בטטה (4)	מלדרה, דופונצ'ליה	20 - 40	14
גזר	לפיגמה, פרודניה	20	14
בצל	תריפס הטבק	20	30
כותנה	הליותיס, אגרוטיס (3)	20	14
אגוזי אדמה (5)	מלדרה	20	30
תירס מתוק, תירס מספוא	הליותיס, נובר התירס האירופי, נובר הקנה המנוקד (6), אגרוטיס	20	7
זית	עש היסמין	0.02%	40
גפן	עש האשכול	0.02%	8
שקד	אנרסיה, עש החרוב	0.02%	7
אפרסק, נקטרינה, משמש	אנרסיה	0.02%	7
רימון	כחליל הרימון	0.02%	14
חמניות (8)	לפיגמה	20	-
	הליותיס	20	30
	תריסית החמנית, תריסית הצלף	10	



**הערות לטבלה**

- (1) בעגבניות יש להוציא את כוורות הבומבוס לפני הריסוס ולהחזירן 24 שעות לאחר הריסוס.
- (2) בעגבניות - להדברת מיהרן החממות, מומלץ לשלב עם מטרונום 0.5%.
- (3) רצוי להמטיר 15 קוב"ד' בתוך 12 שעות מהיישום.
- (4) יש לרסס החל מ-2 - 3 שבועות לאחר שתילה במינון 20 סמ"ק/ד' כל שבועיים או במינון 40 סמ"ק/ד' כל 4 שבועות. מומלץ לבצע אלטרנציה ולהתחיל מעקובת טיפולים ביישום טלסטאר בגלל פעילותו השאריתית בקרקע. יש להמטיר לאחר יישום התכשיר.
- (5) באגוזי אדמה - מועדי היישום ותדירות הטיפולים עפ"י תוכנית הטיפולים המומלצת בהתאם להופעת המזיק, לעוצמת הנגיעות ולמשך הדור. יש לשלב במעקובת הטיפולים תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר, כדי למנוע התפתחות/התבססות של עמידות.
- (6) להדברת נובר הקנה המנוקד, מומלץ לשלב עם מתומקס או לאנט.
- (7) זני פרחים שניבדקו: גבסנית - מירבלה, מיליון סטאר, פרפקטה, ליזיאנטוס - פרטי (ורוד), רוזיטה (לבן), קזבלנקה, נורית - פרנס מנדרין, נץ חלב - דוביום אורנג', סולידנו - גלורי.
- (8) להבטחת היעילות יש להקפיד על נפח תרסיס גבוה (15 ל"ד') וכיסוי מיטבי.