

## גלבן מנקוזב® א.ר. GALBEN MANCOZEB W.P.

קבוצת FRAC: 4 - השפעה על סינטזה של חומצות גרעין  
קבוצת FRAC: M3 - פעילות במגע על ידי קישור רב אתרי

### אבקה רטיבה

למניעה וכטיפול תגובה עם הופעת סימני כשותית או כמשון ראשוניים

Mancozeb + Benalaxyl.....	החומר הפעיל <
אבקה רטיבה המכילה 8% בנלכסיל + 65% מנקוזב.....	התוארית <
נמוכה.....	רעילות לאדם <
נמוכה.....	מסיסות במים <
FMC, USA.....	היצרן <
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת מס' 974.....	מס' הרשוי <

### כללי

בנלכסיל הינו פונגיציד סיסטמי הנקלט במהירות בעלים ובגבעולים של הצמחים המרוססים, ומדביר את הפטריה גם לאחר חדירתה לצמח. מנקוזב מדביר את מחוללי המחלות לפני חדירתם לצמח אך אינו פוגע בהם בתוך הצמח. גלבן מנקוזב מיועד להדברת כשותית וכמשון בשטחים בהם אין אוכלוסית פתוגנים העמידה לבנלכסיל. עם גילוי עמידות מפסיקים את הטיפול בגלבן מנקוזב וממשיכים לטפל בתכשירים נעדרי עמידות צולבת לבנלכסיל.



# גלבן מנקוזב® א.ר. GALBEN MANCOZEB W.P.

## הוראות שימוש

גלבן מנקוזב מיועד לריסוס מניעה או כטיפול תגובה עם הופעת סימני כשותית או כמשון ראשונים.

הגידול	המחלה	המינון (גרם/ד') הריכוז (%)	נפח התרסיס ליטר/ד'	הערות	יישום אחרון לפני הקטיף (ימים)
גפן	כשותית הגפן	0.3% או שילוב ריכוז 0.25% עם קנון 0.25%	עד נגירה	-	14
בצל	כשותית הבצל	300 או שילוב מינון 250 גרם/ד' עם קנון 250 סמ"ק/ד'	60 - 20	-	14
כרוב, כרובית, ברוקולי	כשותית הכרוביים	300	50 - 30	אחת ל-2-3 שבועות	7
מלפפון בשטח גלוי וחסוי	כשותית הדלועיים	300	50 - 30	אחת ל-2-3 שבועות טיפולי	7
תפוח אדמה	כמשון, חלפת	300 או	50 - 20	ביניים יתנו כל שבוע בתכשיר פרוטקטנטי	7
עגבנייה	כמשון	300 + ויטן 100*			7
גזר	כתמים שקועים	1,600	50 - 30	5 - 6 שבועות מהזריעה**	טיפול יחיד

\* להדברת מחלה קיימת

\*\* יש להצניע את התכשיר ביום הריסוס בעזרת השקיית המטרה של 30 - 40 קוב לדונם.

## שילובים

**מלפפון** - ניתן לשלב את התכשיר עם לאנט 20 ת.ג. ולאנט 90 א.מ.

**גפן** - ניתן לשלב עם טיפיקי.

