

# דומארק קומבי DOMARK COMBI

קבוצת FRAC: 3 - השפעה על ביוסינזה של ארגוסטרולים בממברנה  
קבוצת FRAC: M2 - פעילות במגע על ידי קישור רב אתרי

## אבקה רחיפה בשקיות מסיסות

קוטל מחלות בירקות, גידולי שדה, מטע, פרחים ותבלינים

החומר הפעיל	Tetraconazole + Sulfur	<
התוארית	אבקה רחיפה המכילה 1% טטראקונזול + 40% גופרית	<
רעילות לאדם	נמוכה	<
מסיסות במים	נמוכה	<
היצרן	Isagro, Italy	<
מס' הרשוי	רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 01/הצ/1656	<

### כללי

דומארק קומבי הינו תכשיר המכיל תערובת של קוטל סיסטמי וקוטל מגע. תערובת זו מאפשרת לתכשיר פעילות מניעה ופעילות מגע. התערובת מפחיתה את סכנת פיתוח העמידות ומתאימה ליישום בתוכנית הדברה משולבת.



# דומארק קומבי DOMARK COMBI

## הוראות שימוש

הערות	יישום אחרון (לפני הקטיף (ימים)	נפח התרסיס (ל/ד')	הריכוז (%) מינון (גר/ד')	המחלה	הנידול
יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה.	7	40-20	400	קמחונית	עגבניה
יש לרסס כל שבוע ולהקפיד על כיסוי מלא של העלווה.	7	100-40	300	קמחון	מלון
	7	40-20	300	קמחון	אבטיח
יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה. המינון בהתאם לעוצמת הנגיעות.	7	100-40	450-300	קמחון	קישוא
יש לרסס כל שבוע ולהקפיד על כיסוי מלא של העלווה. המינון בהתאם לעוצמת הנגיעות.	7	100-70	500-300	קמחון	תות שדה
יש לרסס עד נגירה, תוך הקפדה על כיסוי התפרחות.	21	עד נגירה	0.3%	קמחון	מנגו
יש להקפיד על כיסוי מלא של האשכולות.	21	עד נגירה	0.3%	קמחון	כרם
יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה.	21	עד נגירה	0.3%	קמחון	אפרסק, נקטרינה
יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה.	-	עד נגירה	300	קמחון	גבסנית
יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה.	14	40-20	300	קמחון	כוסברה

### הערה

אין לרסס דומארק קומבי בימי שרב או בשעות החום בימי הקיץ, כאשר הטמפרטורה עולה על 30°C.

### שילובים

במידה ומשילבים תכשיר נוסף, יש להוסיפו לאחר הכנת תמיסת הריסוס של דומארק קומבי ובהתאם להוראות השימוש המופיעות על התית שלו:

**אבטיח** - ורטימק, מוליט, מוספילן, ספיידר, אויסקט.

**מלון** - קנון 50, מנקו-די, טרימנגול, טלסטאר, ורטימק, אויסקט, מוספילן, ספיידר.

**כרם** - דורסן.

**תות שדה** - אטברון, פליקטרן, ורטימק, טרייסר אולטרה, פלינט, פולאר, מיתוס.

