

קבוצת IRAC: 3A - משבשי פעילות של תעלות נתרן  
+ קבוצת IRAC: 4A - משבשי פעילות של מערכת העצבים

## שילוב של תרחיף קפסולות ותרכיז רחיף (ש.ת.ר. ZC) להדברת מזיקים בירקות ובמטע

imidacloprid + Gamma Cyhalothrin ..... **החומר הפעיל** <

שילוב של תרחיף קפסולות עם תרכיז רחיף המכיל  
אימידאקלופריד 430 גרם בליטר +  
גאמה-סייהלותרין 30 גרם בליטר

בינונית ..... **רעילות לאדם** <

נמוכה ..... **מסיסות במים** <

FMC, USA ..... **היצרן** <

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 14/הצ/4155 ..... **מס' הרשוי** <

### כללי

טוטם הינו קוטל חרקים להדברת מזיקים בירקות ומטע. התערובת של שני החומרים הפעילים משפרת את הפעילות ומאפשרת הדברה של מזיקים שפיתחו עמידות חלקית. החומר משווק בתוארית קפסולרית ייחודית. הקפסולות מגינות על המשתמש, מבטיחות פיזור טוב יותר ומשך פעילות משופר.



הוראות שימוש

יישום אחרון לפני הקטיף (ימים)	הריכוז (%) או המינון (סמ"ק/ד')	המזיק	הגידול
3	75 או 75 בשילוב מטרונום פריים 500 <sup>(1)</sup>	כנימת עש הטבק	כרוביים: כרובית, ברוקולי, קולורבי
3			עגבניה (בשטח פתוח)
7			חציל
3	50	כנימת עלה לדלועיים	מלפפון
-	0.2% <sup>(2)</sup>	חדקונית הדקל האדומה	דקל קנרי
14			תמר מצוי
14	0.05%	כנימת עלה הרימון, כנימת עלה הדלועיים	רימון
28	0.075%	ציקדה ירוקה	אפרסק, נקטרינה, שזיף
14			שקד
30	75 סמ"ק/ד' בנפח תרסים של 15-30 ל"ד'	פסילת הגזר	גזר <sup>(3)</sup>

(1) לשיפור הדברת בוגרים.

(2) יש להגמיע טוטם בכתר הדקל הקנרי (10-15 ליטר לכתר). יש לטפל כל שלושה חודשים. בתמר מצוי יש לרסס סביב החוטרים עד נגירה. יש להגיע להרטבה מלאה.

(3) יש להקפיד על אלטרנציה בין תכשירים מקבוצות כימיות שונות.