

קבוצת IRAC: 9C - פגיעה במנגנון ההזנה של חרקים מוצצים

גרגרים רחפים

קוטל חרקים להדברת כנימות עלה וציקדות בירקות, בגידולי שדה, בכרם, במטע ובפרחים

Flonicamid..... החומר הפעיל <

גרגרים רחפים המכילים 50% חומר פעיל..... התוארית <

נמוכה..... רעילות לאדם <

גבוהה..... מסיסות במים <

ISK - Ishihara Sangyo Kaisha, Japan..... היצרן <

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 11/הצ/4056..... מס' הרשוי <

כללי

טיפיקי הינו קוטל חרקים בעל מנגנון פעולה ייחודי הפוגע במנגנון ההזנה של חרקים מוצצים. טיפיקי יעיל במיוחד להדברת כנימות עלה וציקדות והינו בעל משך פעולה ארוך - עד חודש. הפסקת המציצה והנזק הינם מידיים אך הקטילה נמשכת מספר ימים. התכשיר סיסטמי וטרנסלמינרי. כחלק ממדיניות למניעת התפתחות עמידות אין ליישם יותר מ 2-3 יישומים בעונה.

שילובים

בכותנה, להשגת תוצאות הדברה מהירות מומלץ לשלב עם משטח DX או שטח 90. להדברת כנימות עלה ברימון מומלץ להוסיף שטח 90 או טריטון X.

הוראות שימוש

הגידול	המזיק	המינון (גרם/ד' בנפח תרסיס 15-100 ל'ד')	הריכוז (%) בריסוס עד נגירה	יישום אחרון לפני הקטיפ (ימים)
פלפל	כנימת עלה הדלועיים, כנימת עלה האפרסק	15	0.015	3
			-	30
כותנה	כנימת עלה הדלועיים	15	-	-
אבטיח	כנימת עלה הדלועיים	15	-	7
מלון, מלפפון, דלעת, קישוא, דלורית				3
רימון	כנימת עלה הדלועיים, כנימת עלה הרימון	-	0.015	14
	ציקדות	-	0.03	
אפרסמון	ציקדות	-	0.03	14
כרם	ציקדות	-	0.03	7
תפוח, אגס	כנימת עלה התפוח הירוקה	-	0.015	14
	ציקדות	-	0.03	
נקטרינה, אפרסק	ציקדות	-	0.03	14
שקד	ציקדות	-	0.03	22
פקאן	כנימת הפקאן הצהובה	-	0.015	30
הדרים	כנימת עלה הדלועיים, כנימת עלה הספיראה	-	0.015	30
תות שדה	כנימת עלה הדלועיים, כנימת עלה <i>Aphis frangulate</i>	15	-	3
פרחים ⁽¹⁾	כנימת עלה הדלועיים, כנימת עלה האפרסק, כנימת עלה הספיראה, כנימת עלה <i>Aulocorthum solani</i>	15	0.015	-
	ציקדות	30	0.03	

הערה לטבלה: (1) מיני פרחים: ארליה, בת חן, גיבסנית, גרברה, חרצית, לוע הארי, ליזיאנטוס, לנטנה, נץ חלב, סולידגו, סנדובילה, עופרים, ציפורן, ציפורני חתול, פיטוספורום, רוסקוס, שושן צחור.

