

קבוצת IRAC: 9C - פגיעה במנגנון ההזנה של חרקים מוצצים

גרגרים רחפים

קוטל חרקים להדברת כנימות עלה וציקדות בירקות, בגידולי שדה, בגפן, במטע ובפרחים

Flonicamid..... החומר הפעיל <

גרגרים רחפים המכילים 50% חומר פעיל..... התוארית <

נמוכה..... רעילות לאדם <

גבוהה..... מסיסות במים <

ISK - Ishihara Sangyo Kaisha, Japan..... היצרן <

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 11/הצ/4056..... מס' הרשוי <

כללי

טיפיקי הינו קוטל חרקים בעל מנגנון פעולה ייחודי הפוגע במנגנון ההזנה של חרקים מוצצים. טיפיקי יעיל במיוחד להדברת כנימות עלה וציקדות והינו בעל משך פעולה ארוך - עד חודש. הפסקת המציצה והנזק הינם מידיים אך הקטילה נמשכת מספר ימים. התכשיר סיסטמי וטרנסלמינרי. כחלק ממדיניות למניעת התפתחות עמידות אין ליישם יותר מ 2-3 יישומים בעונה.

שילובים

ככותנה, להשגת תוצאות הדברה מהירות מומלץ לשלב עם משטח DX או שטח 90. להדברת כנימות עלה **ברימון** מומלץ להוסיף שטח 90 או טרטון X.

הוראות שימוש

הגידול	המזיק	המינון (גרם/ד' בנפח תרסיס 15-100 ל'ד')	הריכוז (%) בריסוס עד נגירה	יישום אחרון לפני הקטיף (ימים)
פלפל תפוח אדמה	כנימת עלה הדלועיים, כנימת עלה האפרסק	15	0.015	3
				30
כותנה	כנימת עלה הדלועיים	15	-	-
אבטיח ארטישוק מלון, מלפפון, דלעת, קישוא, דלורית	כנימת עלה הדלועיים	15	-	7
				14
				3
רימון	כנימת עלה הדלועיים, כנימת עלה הרימון	-	0.015	14
	ציקדות	-	0.03	
אפרסמון	ציקדות	-	0.03	14
גפן	ציקדות	-	0.03	7
תפוח, אגס	כנימת עלה התפוח הירוקה	-	0.015	14
	ציקדות	-	0.03	
נקטרינה, אפרסק	ציקדות	-	0.03	14
שקד	ציקדות	-	0.03	22
פקאן	כנימת הפקאן הצהובה	-	0.015	30
הדרים	כנימת עלה הדלועיים, כנימת עלה הספיראה	-	0.015	30
תות שדה	כנימת עלה הדלועיים, כנימת עלה <i>Aphis frangulate</i>	15	-	3
(1) פרחים	כנימת עלה הדלועיים, כנימת עלה האפרסק, כנימת עלה הספיראה, כנימת עלה <i>Aulocorthumb solani</i>	15	0.015	-
	ציקדות	30	0.03	

הערה לטבלה: (1) מיני פרחים: ארליה, בת חן, גבסנית, גבררה, חרצית, לוע הארי, ליזיאנטוס, לנטנה, נץ חלב, סולידגו, סנדובילה, עופרים, ציפורן, ציפורני חתול, פייטוספורום, רוסקוס, שושן צחור.

