

PRIORI EXTRA

פריורי אקסטרה®

קבוצת FRAC: 11 - מעכבי תהליכי נשימה
+ קבוצת FRAC: 3 - השפעה על ביוסינטזה של ארגוסטרולים בממברנה

תרכיז רחיף

קוטל פטריות סיסטמי להדברת
מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה ומטעים

| | |
|-------------|--|
| החומר הפעיל | Cyproconazole + Azoxystrobin |
| התוארית | תרכיז רחיף המכיל ציפרוקונזול 80 גר/ל' + אזוקסיסטרובין 200 גר/ל' |
| רעילות לאדם | נמוכה |
| מסיסות במים | גבוהה |
| היצרן | Syngenta Crop Protection AG, Switzerland |
| מס' הרשוי | רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 07/הצ/1908 |

כללי

פריורי אקסטרה הינו קוטל פטריות המכיל מרכיב סיסטמי השייך למשפחת הטריאזולים ומרכיב טרנסלמינרי בעל פעילות קורטיבית מקבוצת הסטרובילורנינים. התכשיר יעיל נגד מגוון מחלות אך יתרונו העיקרי הוא במניעה והדברה יעילה של חלדונות וקמחוניות בגידולים השונים. השילוב של שני חומרים פעילים משפר את היעילות ומפחית את הסיכון בפיתוח עמידות.

שילובים

פריורי אקסטרה המיושם בריסוס ניתן לשילוב עם התכשירים הבאים, בהתאם למינונים וההנחיות המופיעות בתוויות האריזה שלהם:

עגבניה - טלסטאר, טיטאן, אביר.

פלפל - אטברון, פיראט, פגסוס.

פפריקה - אטברון.

שקד - טלסטאר.



הוראות שימוש

| הגידול | המחלה | המינון (סמ"ק/ד') בנפח קטן (עד 100 ל"ד') | הריכוז (%) בריסוס נגירה (מעל 100 ל"ד') | יישום אחרון לפני הקטיף (ימים) |
|---|---|---|--|-------------------------------------|
| חיטה, שיבולת שועל | מיני חלדונות (עלה, צהוב), ספטוריה, קמחון | 30 | - | 60 גרגרים |
| | | | | 30 מספוא |
| תירס | מחלת הכתם העדשתי (הלמינטוספוריום) | 30 | - | 7 |
| חמנית | קמחון החמנית, חלדון החמנית | 25 | - | 60 |
| פלפל ⁽¹⁾ , פפריקה ⁽¹⁾ , בשדה פתוח בלבד | קמחונית | 40 | 0.04 | 4 |
| עגבניה ⁽¹⁾ בשדה פתוח בלבד | קמחונית | 40 | 0.04 | 10 |
| פלפל, פפריקה, עגבניה, חציל | קמחונית | 100 (בהנמעה ⁽²⁾) | - | 2 |
| אפרסק, שזיף יפני, שזיף אירופאי | חלדון האפרסק/ חלדון השזיף | - | 0.03 | 21 |
| שקד | חלדון השקד | - | 0.03 | 21 |
| אפרסק, נקטרינה | קמחון האפרסק | - | 0.03 | 21 |
| טרנון | חלדון הטרנון | 40 | - | 17 |
| שום | חלדון השום, סטמפיליום | 25 | - | 15 |

הערות לטבלה

(1) בירקות אין לרסס יותר מריסוס עוקב אחד.
 (2) יישום ראשון לא לפני 40 יום משתילה ולא לפני התחלת חנטה. עד 2 יישומים בעונה בהפרש של כ-40 יום.
 אין ליישם במצע מנותק או בעת עקה (מים, חום, אור וכיו"ב. בערבה יש להמתין לפחות 10 ימים לאחר הסרת רשתות צל). יש לטפל לפני הופעת המחלה.
 כמו כל תכשיר המיושם בקרקע, חשוף פריורי אקסטרה להתפתחות תופעת "פרוק מיקרוביאלי מואץ". כדי למנוע התפתחות תופעה זו מומלץ לא לטפל ברציפות בפריורי אקסטרה.
נבדק בזנים: פלפל: מונטי, רומנס, 7182, 4833. **פפריקה:** שלהבת. **עגבניה:** 1125, 1912, 540, איקרם, אנטונולה, 8892, ניקוס. **חציל:** סינטיה, קלאסיק, 1726.
 בזנים שלא נבדקו יש לבדוק בטיחות על קטע קטן לפני הישום המסחרי. אין לשלב עם עוד תכשיר. יש להזריק למערכת טפטוף **מנותק אויר** באמצעות משאבת דישון לאורך 2/3 האחרונים של השקיה בת 4-6 קוב/ד'. בסיום היישום יש לשטוף את המערכת ב-1 קוב/ד' מים.

הערה: אין ליישם פריורי אקסטרה בתנאי עקה, כמו הפרשי טמפרטורות גדולים במשך היממה. אין להשתמש בתמיסת ריסוס בעלת pH גבוה ו/או לרסס בזמן היישום עם תכשירים מווסתי גידול (PGR).

