

## רצועות אפיסטן

תכשיר להדברת אקרית הוורואה בכוורות


החומר הפעיל	Tau-Fluvalinate 10.3%
התוארית	רצועות ספוגות חומר פעיל. בכל רצועה 0.8 גרם חומר פעיל משולב בPVC.
רעילות לאדם	נמוכה
היצרן	Vita (Europe) Limited, England
מס' הרשוי	רשיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מס' 1575

### כללי

וורואה הינה אקרית קורים החיה כטפיל על דבורים ונחשבת כמזיק עיקרי ומסוכן בכוורות דבורים. הנקבה של אקרית זו ניזונה מההמולימפה של הדבורים הבוגרות ושל הלארוות והנימפות הנמצאות בתאים. על מנת להשיג הדברה מושלמת, יש להדביר את האקריות הנמצאות על הדבורים הבוגרות וכן להגן על הלארוות החל משלב ההטלה לאורך כל שלבי התפתחותם. רצועות אפיסטן פותחו במיוחד למטרות אלו.

### הוראות שימוש

רצועות האפיסטן בכל אריזה מגיעות מחוברות אחת לשניה. על מנת להפרידן יש לאחוז באחת הפינות (ראה איור 1) ולמשוך לאורך קו החיץ המפריד בין הרצועות מלמעלה למטה. חזרו את הרצועות שאינן בשימוש חזרה לאריזה המקורית. רצועות האפיסטן מונחות בין חלות הולד ומתוכננות כך שהדבורים יוכלו ללכת בין שני יצידי הרצועה. על מנת לתלות את הרצועות בין המסגרות יש לסובב את הכנפיים של כל רצועה (ראה איור 2).



השתמש בשתי רצועות אפיסטן לכוורת אחת. תלה את הרצועות בין מסגרת 3 ו-4 ובין מסגרת 7 ו-8, חשוב שהרצועות יונחו בין חלות הוולד. טפל עם אפיסטן בכוורות באביב או בסתיו. באביב יש להשתמש ברצועות לאחר הפריחה, ובסתיו - לאחר האיסוף האחרון של הדבש, בכל מקרה הטיפול יינתן בכוורות עם קומה אחת בלבד. יש להוציא את הרצועות מהכוורת 6 - 8 שבועות לאחר הכנסתם, על מנת למנוע התפתחות עמידות ולאחר נידוף החומר הפעיל.

יש להשתמש ברצועות אפיסטן בזמן קרוב ככל האפשר למועד פתיחת האריזה. אין לעשות שימוש חוזר ברצועות אפיסטן.

קיים חשש להימצאות אוכלוסיות וורואה עמידות לחומר הפעיל באפיסטן לפיכך מומלץ לנטר את אוכלוסית הוורואה בסיום הטיפול ובמידה והטיפול אינו מוצלח יש לבצע טיפול נוסף עם תכשיר מקבוצה כימית אחרת.

החומר הפעיל באפיסטן עלול להצטבר בשעווה ולכן מומלץ להחליף חלות אלה בתדירות גבוהה.

לא מומלץ למחזר שעווה מחלות שנחשפו לתכשיר.