

פרומון לבלבול זכרים של עש החרוב

(Z,E)-7,9,11-Dodecatrienyl formate.....	החומר הפעיל <
משחה המכילה 2% חומר פעיל.....	התוארית <
נמוכה.....	רעילות לאדם <
נמוכה.....	מסיסות במים <
ISCA Technologies, ארה"ב.....	היצרן <
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 19/הצ/4463.....	מס' הרשוי <
רשיון לחקלאות אורגנית 7499.....	

**כללי**

ספלאט עש החרוב הינו תכשיר המכיל חיקוי של פרומון המין הנקבי המיועד לבלבול זכרים של המזיק עש החרוב (*Ectomyelois ceratoniae*).  
 באמצעות הפורמולציה הייחודית שלו, התכשיר משחרר את הפרומון בצורה מבוקרת, יוצר אווירה הרוויה בפרומון ומפחית את סיכויי ההזדווגות של המזיק בשטח. התוצאה המתקבלת היא פחות נקבות מופרות ופחות נזק מזחלי העש.  
 התכשיר עמיד בפני פירוק U.V וכן עמיד, במידה רבה, בפני שטיפה ע"י הגשם ו/או המטרה.



# SPLAT EC-O ספלאט עש החרוב

## הוראות שימוש

**אופן היישום:** התכשיר מוכן לשימוש באריזתו המקורית. אין למהול במים. יש ליישם את התכשיר כאשר צפוייה עלייה ברמת המזיק בשטח (לפני התחלת גיחת הבוגרים). יש ליישם את התכשיר על גבי ענף או עלה בשליש העליון של העץ. מומלץ להניח את הטיפול במקום מוסתר מהשמש. היישום יתבצע בעזרת רובה שפופרות (סיליקון) סטנדרטי או ייעודי או בעזרת רחפן ייעודי.

הגידול	המזיק	מינון (גר/ד')	הערות
שקדים, הדרים	עש החרוב ( <i>Ectomyelois ceratoniae</i> )	50	משך פעילות התכשיר כ-8 שבועות <sup>(1)</sup>

(1) יש להציב מלכודות פרומון לניטור הלכידות לפני יישום הפרומון. במשך כל תקופת פעילות התכשיר הלכידה במלכודת הניטור צריכה להיות אפס או קרובה לאפס (תתכן לכידה אקראית מועטה). תחילת לכידה רציפה במלכודות הניטור מסמנת את גמר פעילות התכשיר. במהלך העונה יש לבצע פיקוח רציף לניטור הנגיעות בביצים וזחלים של עש החרוב.

- בשקדים:** יש לפזר באופן שווה את טיפות התכשיר בשטח המטופל. על כל עץ יש ליישם 2 טיפות במשקל כ-1 גרם לכל טיפה, הטיפות יונחו משני צידיו של העץ (סך הכל כ-2 גרם לעץ, המשקל המדויק תלוי במספר העצים לדונם).
- בהדרים:** יש לפזר באופן שווה את טיפות התכשיר בשטח המטופל. על כל עץ יש ליישם טיפה אחת. משקל הטיפול יהיה בהתאם לכמות העצים בדונם (עדיף ליישם את הטיפול מצידו הצפון-מערבי של העץ) לדוגמא: בחלקה עם 50 עצים משקל הטיפול על כל עץ יהיה 1 גרם.
- מטח גשמים חזק או ברד עלולים לפגוע בהשרדות התכשיר על גבי העצים. יעילות הטיפול, בספלאט עש החרוב, בחלקות קטנות מ-50 דונם או בחלקות צרות עלולה להיות פחותה. ככל שהאזור המבולבל יהיה גדול יותר כך האפשרות לנזק בפרי מנדידתן של נקבות מופרות יהיה קטן יותר.
- חלקות לא מטופלות עלולות להוות מקור לנקבות מופרות וכמוצאה מכך ייגרם נזק לפרי במיוחד לאורך הגבולות ובשכנות לחלקות המטופלות.
- השימוש בקוטלי חרקים אחרים לא פוגם בפעילות הבלבול לכן מומלץ לרסס בהתאם לצורך.

