

TARGET MSMA טרגט מ.ס.מ.אי.

קבוצת HRAC: Z - מנגנון הפעולה אינו ידוע

תרכיז נוזלי

קוטל עשבים כללי להדברת מגוון גדול של עשבים בכותנה, במטעים ובפרדסים.

Monosodium methane arsonate - MSMA	החומר הפעיל
תרכיז נוזלי המכיל 480 גרם חומר פעיל בליטר	התוארית
נמוכה	רעילות לאדם
גבוהה	מסיסות במים
מהיר	פרוק בקרקע
לוכסמבורג תעשיות בע"מ, ישראל	היצרן
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 76/הצ/349	מס' הרשוי

כללי

טרגט מ.ס.מ.אי. הינו קוטל עשבים מקבוצת הארסונאטים הפועל על עשבים חד ורב שנתיים ע"י מגע והמתאים להדברת עשבים בשטחי כותנה, במטעים ובהדרים שאינם נושאים פרי. טרגט מ.ס.מ.אי. פועל על העשביה ע"י גרימת צריבות במוקדי המגע ובחלקי צמח אחרים אליהם נע החומר, עד לתמותת העלווה. פעילותו מוגברת בטמפרטורות גבוהות בתנאי אור מלא. צמחי הכותנה עמידים לטרגט בתנאי שלא ייפגעו קודקודי הצמיחה או העלווה, ולכן מתאים ומיועד התכשיר לטיפול הדברה מכוונים של עשבים חד ורב-שנתיים אשר נבטו והציצו בשטחי הכותנה.

הדברת עשבים

טרגט מ.ס.מ.אי. קוטל עשבים דגניים קשי הדברה כמו דורת ארם-צובא (כוסאב) ופספלוך וכן דגניים קיציים חד שנתיים בגובה של 5 ס"מ. בריסוס מכוון על פני עלותם, מתאים טרגט מ.ס.מ.אי. להדברת העשבים הבאים: פספלוך, נבטי דגניים, נבטי רגלת הגינה, דורת ארם-צובא (כוסאב), נבטי ירבוז, נבטי לכיד, נבטי סולנום (ענבי שועל).



TARGET MSMA טרגט מ.ס.מ.א.י.

הוראות שימוש

הגידול	המינון (סמ"ק/ד' או % מנפח התרסיס)	נפח התרסיס לדונם	מועד הטיפול	הערות
כותנה	1.5%-3% (1)	מעל 20 ליטר (2)	קדם זריעה, קדם הצצה או אחר הצצה של הכותנה	יישום אחר הצצה בריסוס מכוון בלבד. אין לרסס בכותנה לפני שהגיעה לשלב שני עלים אמיתיים או לאחר הפעת פרח ראשון בשדה
מטע והדרים	1.5%-3% (1)	מעל 20 ליטר (2)	-	להתחיל בריסוס בסוף אפריל עד תחילת מאי על צמחי כוסאב מבוגרים ככל האפשר. יש לחזור על הטיפול עם התחדשות צימוח הכוסאב.

הערות לטבלה

- (1) 1.5% בטמפרטורות גבוהות מ- 26 מעלות צלסיוס.
 3% בטמפרטורות בין 23-26 מעלות צלסיוס.
 אין להשתמש בתכשיר בטמפרטורות נמוכות מ- 23 מעלות צלסיוס.
- (2) בהתאם למצב נוף העשביה, על מנת להבטיח כיסוי מלא של נוף העשבים.

הערה

אין להעלות בהמות לרעייה בשטחי כותנה מטופלים, או על פני עשביה שטופלה בטרנט.

