

OHAYO

אוהיו

أوهايو

תרכיז רחף

להדברת מחלות בתפוז"א וגפן, למניעת מחלות קרקע במלון ותפוז"א ולטיפול מונע בזרעי אגוזי אדמה ובפקעות זריעה של תפוז"א

התכולה: 500 גרם Fluazinam בליטר.

כללי: אוהיו הינו קוטל מחלות מקבוצת הפירידיאמינים, הפועל ע"י עיכוב תהליך זירחון חימצוני בפתוגנים. התכשיר יעיל להדברת טווח רחב של מחלות, באמצעות מניעה יעילה של התפתחות המחלות. אוהיו פעיל על מספר אתרים שונים בפתוגנים ולכן הסיכוי להתפתחות תנגודת לתכשיר הינו מינימלי.

מיוצר ע"י: Phyteurop, צרפת.

עבור: ISK - Ishihara Sangyo Kaisha, יפן.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת: 1382/הצ/95.

Batch No:

דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)

מספר או"ם: 3082

מספר אצווה:

נער היטב לפני השימוש!

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!

ليس للاستعمال المنزلي !

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

תכולה: 5 ליטר
Net content: 5 Liter

עדכון תוית: נובמבר 2017
Label updating: November 2017

לוקסמבורג תעשיות בע"מ

טל: 03-796 4300 www.luxembourg.co.il



לוקסמבורג

121-3/7111

7-3105-200-041-14/18

המשך הוראות השימוש

הגידול	המחלה	אופן יישום	נפח תרסיס 40-20 ליטר/ד' מינון (סמ"ק/ד')	ריסוס עד גגירה ריכוז (%)	הערות
תפוח-אדמה	נימור שחור (ריזוקטוניה) ⁽⁴⁾	טיפול קרקע	500 סמ"ק/ד'	ריסוס בפס הזריעה	ריסוס בפס הזריעה, בנפח תרסיס 20 ל'/ד'. יש ליישם בשתי דיוות קונג'ט, רוחב פס 30 ס"מ. דיוה ראשונה לאחר פתיחת התלם ושניה על מקום נפילת הפקעות.
תפוח-אדמה	גרב אבקתי ⁽⁷⁾	טיפול בפקעות הזריעה	450 סמ"ק תכשיר בתמיסה של כ-2 ליטר מים, לכל טון פקעות זריעה	ריסוס ULV (בנפח נמוך מאוד) בריכוז 2%	יישום בנפח נמוך בפקעות המיועדות לזריעה
אגוז-אדמה בזדים נועם, שולמית	שורש שחור (אספרגילוס, ריזופוס)	טיפול זרעים	ריסוס ULV (בנפח נמוך מאוד) בריכוז 2%	נפח תרסיס 5 סמ"ק לק"ג זרעים בצפיפות כסוי של כ-1,200 טיפות/סמ"ד.	

אזהרות: • רסס בתנאים בהם הרוחף מינימלי, המנע ממגע עם ענן התרסיס. • אין להכנס לשדה מרוסס ללא הגנה על העור, המנע ממגע עם עלווה מטופלת ביום הריסוס. • אוהיו עשוי לגרום בעור למספר קטן של בני אדם גרישים, על אנשים אלה להמנע ממגע חוזר עם התכשיר.

אמצעי זהירות ומיגון: • אוהיו היו קוטל מחלות ויש להשתמש בו באמצעי הזהירות המקובלים בתכשירי הדברה. • לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבול עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי והגנה על השיער. כפפות עמידות לכימיקלים גומי/ניטריל (לפי תקן EN-374/3), מסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן מסוג ABEK-P3 (תקן EN-14387) ומשקפי מגן (תקן EN-166). • המנע מבליעה, שאיפה או מגע התכשיר בעיניים או בעור חשוף. • המנע מאכילה, שתייה ועישון בעת העבודה עם התכשיר.

סכנות לסביבה: התכשיר אינו רעיל לדבורים. התכשיר רעיל לדגים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה הימית. מנע זרימה ורוחף לבריכות דגים למקורות מים.

הכנת התרסיס: יש למדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס, לשפכה לתוך המרסס המלא בחציו מים ולהשלים את כמות המים תוך ערבול תמידי.

הוראות השימוש:

הגידול	המחלה	אופן יישום	נפח תרסיס 40-20 ליטר/ד' מינון (סמ"ק/ד')	ריסוס עד גגירה ריכוז (%)	הערות
תפוח-אדמה	כמשון ⁽⁴⁾	טיפול עלווה	50	-	מטפלים החל מהצצה ולפני הפעלת המחלה מיד 7-12 יום בהתאם לקצב הגידול והנגיעות ⁽²⁾
גפן ⁽³⁾	עובש אפור (בוטריטס) ⁽⁴⁾	טיפול עלווה	-	0.1%	טיפול מניעה, לפני הפעלת נגיעות. 0.15% - לטיפול עם תחילת נגיעות וכאשר קיימת סבירות גבוהה לנגיעות.
	עובש שחור (אספרגילוס), ריזופוס (ריקבון ימימי)	טיפול עלווה	-	0.1% - לטיפול מניעה, לפני הפעלת נגיעות. 0.15% - לטיפול עם תחילת נגיעות וכאשר קיימת סבירות גבוהה לנגיעות.	יש לרסס חודש לפני בלבול צפוי, לאחר זרימה. מומלץ להשלים בשני ריסוסים מנוקדי, ראשון בראשית בלבול ושני 10 ימים לאחר מכן.
	זרוע מתה	טיפול עלווה	-	0.1% בתוספת 2% שמן מינרלי (אולטרה פיין)	מוהלים את התכשיר ומגמימים לפי 0.5-1.0 ליטר/צמח. מיישמים החל משבועיים לאחר שתילה/זריעה ולאחר מכן במרווחים של שבועיים עד לקטיף.

הערות לטבלה: (1) טיפולים למניעת כמשון, ימנעו גם חלפת (2) מטפלים החל מהצצה ובעיקר לפני סגירת השורות ולפני הופעת המחלה בתדירות של 12 ימים. עם הופעת המחלה או עליה בקצב הצימוח מצופפים לטיפול כל 7 ימים. (3) גפן בזדים: סוביניון לבן, שאנן, פרג' קולומבר, קברנה, מוסקט, סולטנינה (תומפסון), שרדונה, ברלינקה ושמי (חברוני). (4) טיפולים בסוף העונה למניעת בוטריטס יפחיתו התפתחות כשותית אך לא ידברו כשותית קיימת. (5) במלונים לפני היישום יש להרטיב קרקע ב- 2/3 מכמות השקיה רגילה ולאחריו להשלים את השליש הנותר. יישום אוהיו אינו חלופה לשיטות הדברה חלופיות (מתיל ברומיד, כנות עמידות) ומומלץ ליישמו בשילוב עם שיטות אלה. (6) יעילות מניעת התפתחות קשיונות הריזוקטוניה הינה עד שבועיים ממועד ייבוש העלוה. (7) הטיפול מיועד למניעת הפצת הנגיעות בגרב אבקתי במקרה של פקעות נגועות בלבד. הטיפול בפקעות אינו מונע את התפתחות מחלת הגרב האבקתי במקרה של פקעות נגועות. אין לטפל בפקעות זריעה שבהם מת הנגיעות בגרב אבקתי עולה על שכיחות של 10%.

שילובים: בתפוחי אדמה - בריסוס עלווה ניתן לשלב אוהיו עם טלסטאר בהתאם למינונים המופיעים בתוית של כל תכשיר. **בגפן** - ניתן לשלב אוהיו עם קנון 50 וטריירי אולטרה.

הערה: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשטחים שבשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

תרכיז רחף

להדברת מחלות בתפ"א וגפן למניעת מחלות קרקע במלון ותפ"א
ולטיפול מונע בזרעי אגוזי אדמה ובפקעות זריעה של תפ"א

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!

דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)

מספר או"ם: 3082

מספר אצווה:

ليس للاستعمال المنزلي !

ניקוי המרס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאיות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: • לאחר השימוש, רחץ היטב את הידיים במים ובסבון. • לאחר הריסוס, החלף את הבגדים והעבר לכביסה בנפרד את הבגדים המשושמים.
זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס: 24 שעות.

איחסון: אחסן את התכשיר אך ורק במחסן נעול המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת, וחייב בפניו לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב. תכשיר שנשפך, יש להספיג בנסורת או בחול, לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות הריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפי אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מסודר.

עזרה ראשונה: • במקרה מגע **בעור**, יש להפסיק מיד את העבודה, להסיר את הבגדים המזוהמים ולשטוף את המקום המאולח במים ובסבון. • במקרה מגע **בעיניים**, יש לשטוף אותן כ- 15 דקות במים זורמים ולפנות לרופא. • במקרה של **שאיפה**, העבר את הנפגע למקום מאוורר. השג עזרה רפואית. • במקרה של **בליעה**, אל תגרם להקאה - קרא לרופא. • בכל פניה לרופא, הצג בפניו תית זו.

מידע לרופא: מרכז למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טלפון: 04-7771900.

לובסמבורג תעשיות בע"מ



טל: 03-796 4300 www.luxembourg.co.il