

CANON 50

קנון 50

קבוצת FRAC: 33 - מנגנון פעולה שאינו ידוע

תרכיז נוזלי

תכשיר סיסטמי להדברת כשותית במלפפון, מלון, בצל, צנונית, חימצה, חסה, צמחי תבלין ונפן. להדברת ריקבון חום, ריקבון שורש וחלפת בהדרים, ריקבון שורש באבוקדו, ומללת (בוטריוספריה) באבוקדו, נקטרינה ואפרסק.

החומר הפעיל חומצה זרחיתית

התוארית תכשיר נוזלי המכיל 780 גרם מלח אשלגן זרחיתי בליטר (500 גרם חומצה זרחיתית בליטר)

רעילות לאדם נמוכה

מסיסות במים גבוהה

היצן לוכסמבורג תעשיות בע"מ, ישראל

מס' הרשוי רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 1462/הצ/97

כללי

קנון הינו תכשיר בעל השפעה סיסטמית המכיל את היסודות אשלגן וזרחן. האניון הזרחיתי שבתכשיר, יעיל במניעה והדברה של מחלות צמחים באמצעות פגיעה ישירה בפטריה והגברת תנגודת הצמח למחלה. התכשיר אינו רעיל למשתמש ולסביבה ואינו מלכלך את הפרי. להשגת תוצאות מירביות בהדברת המחלות המפורטות בתווית יש להתחיל בטיפול לפני הופעת המחלה או עם ראשית הנגיעות. למניעת כשותיות, וכפועל יוצא ממנגנון הפעולה של קנון, מומלץ ליישם לפחות 3-2 ריסוסים ברצף. להדברת שאר המחלות יש לעקוב בקפידה אחר הוראות התווית.

הערות כלליות

אין לעלות במינון התכשיר מעבר למומלץ מחשש לצריבות בעלווה. אין לטפל כאשר הצמחים במצב עקה, או בתנאי מזג אוויר קשים כגון טמפרטורות גבוהות, חמסין או קרה.



הוראות שימוש

הערות	יישום אחרון (לפני הקטיף (ימים))	הריכוז (%)	המינון (סמ"ק/ד')	המחלה	הנידול
למניעת הדבקה יש לטפל במשתלה או בשדה שני טיפולים בריכוז המומלץ במרווח של כ- 10 ימים. ריסוס ראשון לפחות 3 ימים לפני ארוע הדבקה חזוי.	3	0.5	-	כתמי עלים חיידקיים (קסנטומונס וסיקטוריה)	פלפל
ריסוסי מניעה במרווחים של 7-14 יום, בנפח תרסיס של 20-40 ל"ד'.	3	-	350	כשוטית החסה	חסה
ריסוסי מניעה - 3 ריסוסים לפחות, במרווחים של שבוע. נפח תרסיס 40-100 ל"ד' (ולא יותר) בהתאם לגודל הצמחים. ריסוס ראשון לאחר חודש משתילה.	3	-	350	כשוטית הדלועים	מלפפון בשדה פתוח ובנידול חסי, מלון
יש להתחיל בטיפולים לפני הופעת מחלה, 3 ריסוסים לפחות, במרווחים של שבוע.	3	-	350	כשוטית הבצל והשום	בצל
ריסוסי מניעה במרווחים של 7-14 יום, בנפח תרסיס של 20-40 ל"ד'.	3	-	350	כשוטית המצליבים	צנונית
המינון בהתאם לעוצמת המחלה ומשך ההדברה הנדרש.	3	-	350-250	כשוטית החימצה	חימצה
מיועד למניעת כשוטית בעלווה. בתקופה הרגישה יש לרסס לפני הופעת המחלה, לפחות 3 פעמים בתדירות של 7-10 ימים.	3	0.3	-	כשוטית הגפן	גפן
מיועד לריסוס מניעה בפרדס בתחילת עונת הגשמים.	3	0.25	-	רקבון חום ⁽²⁾	הדרים ⁽¹⁾
למניעת הדבקה אביבית יש לרסס בסיום הפריחה, וכל שלושה שבועות עד חודש לאחר מכן בהתאם לעוצמת הנגיעות, עד סוף חודש יוני. למניעת הדבקה סתוית יש לרסס מידי שלושה או ארבעה שבועות החל מראשית חודש ספטמבר.	3	0.25	-	כתמי חלפת (אלטרניה) בפרי ⁽³⁾	

הוראות שימוש

הערות	יישום אחרון (לפני הקטיף (ימים))	הריכוז (%)	המינון (סמ"ק/ד')	המחלה	הגידול
מיועד לטיפול מניעה. המינון מתאים לשקית גידול בת 8 ליטר. אין לטפל לפני או אחרי גיזומים דרסטיים של עלוות השתילים.	-	-	5 סמ"ק לשתיל	ריקבון שורש (פיטופטורה)	משתלות (4) הדרים
-	3	-	בהזרקה לגזע 7.5 סמ"ק לכל 1 מטר של קוטר נוף העץ	ריקבון שורש (פיטופטורה)	אבוקדו (5)
יש לחזור על הטיפול באינטרוול של 45-60 ימים	3	1.5 ליטר לדונם בהגמעה (6) + ריסוס בריכוז 0.5% עם משטח L-77 בריכוז 0.025% או סומה 0.05%		מללת (בוטריוספריה)	אבוקדו צעיר (עד 3 שנים מנטיעה)
יש לחזור על הטיפול באינטרוול של 45-60 ימים	3	1.5 ליטר לדונם (בהגמעה (6))		מללת (בוטריוספריה)	אבוקדו בוגר (מעל 3 שנים)
יש לחזור על הטיפול באינטרוול של 45-60 ימים מתחילת לבלוב ועד השלכת	3	ריסוס נוף בריכוז 0.3%			נקטרינה, אפרסק
מיועד למניעת כשותית בעלווה. יש לרסס לפני הופעת המחלה, באינטרוול של 7-10 ימים.	3	-	350	כשותית	צמחי תבלין: פטרזיליה, רוזמרין, נענע (מנטה), גד השדה (כוסברה), עירית, רוקולה (רוקט), ריחן (בזיל)



הערות לטבלה:

- (1) בפרדס אין לשלב עם כל תכשיר אחר. אסור לרסס אם ניתן או צפוי טיפול בשמן במרווח זמן של שלושה שבועות מיישום קנון.
- (2) יש לרסס את חלקו התחתון של העץ עד לגובה 1.5 מטר מן הקרקע, בנפח תרסיס של 150-200 ל"ד'.
- (3) הטיפול מוריד במידה ניכרת את הנגיעות בכתמי חלפת (אלטרנריה) בפרי אך אינו מונע את התופעה לחלוטין. יש לרסס את נוף העץ כולו בנפח תרסיס המבטיח כיסוי מלא. ניתן ליישם לסירוגין עם תכשירים מורשים אחרים, בהתאם להמלצות משרד החקלאות.
- (4) ניתן ליישם בהגמעה עם 250 סמ"ק מים, או דרך מערכת הטיפול עם 400-500 סמ"ק מים לשתיל. יש לטפל רק כאשר מצע הגידול רטוב, (עדיף יום לאחר השקיה). הטיפול יעיל לפחות 40 יום ממועד היישום.
- (5) יש לטפל פעמיים בשנה בעת צימוח שורשים (לאחר סיום צימוח העלוה) במהלך חודש יוני וסוף אוגוסט. בכל מועד מומלץ לחזור על היישום פעם נוספת לאחר 10 ימים. בהזרקה - יש למהול 7.5 סמ"ק תכשיר לפי יחס של 1:1 במים ולהזריק לגזע. כל 7.5 סמ"ק תכשיר, יש להזריק בנפרד במקום אחר בגזע העץ (מומלץ להשתמש במזרק וטרירני). לפני ביצוע הטיפול עדיף להתייעץ עם מדריך ש.ה.מ. או עם אחד מאנשי השדה של החברה.
- (6) יש להנמיץ במהלך השליש השני של השקיה משקית. מומלץ להתייעץ עם אנשי החברה או גורמי ההדרכה.

שילובים

- מלפפון בחממה** - ניתן לשלב עם דומארק, מנקו-די, פיראט, ורטימק (ללא שמן), אופיר, באיפידן, סוויץ', מיתוס, רסק.
- מלפפון בטטה פתוח** - ניתן לשלב בנוסף לנ"ל גם עם טיטאן, קוצייד.
- מלון** - ניתן לשלב עם מנקו-די, גופריתר, דומארק, טלסטאר, מוספילן, ורטימק (ללא שמן).
- חימצה** - ניתן לשלב עם טלסטאר, אטמי אקסטרה, קומודור, פוליקור, סקור, עמיסטר.
- גפן** - ניתן לשלב עם דומארק, פוליקור, אופיר, דורסן, טיטאן.
- בזיל** - ניתן לשלב עם פולאר, פרוקליים, ורטימק, מטרונם פריים.
- לפני ריסוס אחד השילובים הנ"ל קרא בעיון את תיות התכשיר המשולב ונהג לפי ההנחיות המופיעות בה.