

פרומון לבלבול זכרים של עש התפוח

החומר הפעיל	(E-E)-8,10-Dodecadien-1-OL 10%
התוארית	משחה המכילה 10% חומר פעיל
רעילות לאדם	נמוכה
מסיסות במים	נמוכה
היצרן	ISCA Technologies, ארה"ב
מס' הרשוי	רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 4470/הצ/20

כללי

ספלאט עש התפוח הינו תכשיר המכיל פרומון מין נקבי המיועד לבלבול זכרים של המזיק עש האשכול (*Cydia pomonella*). באמצעות הפרומולציה הייחודית שלו, התכשיר משחרר את הפרומון בצורה מבוקרת, יוצר אווירה הרוויה בפרומון ומפחית את סיכויי ההזדווגות של המזיק בשטח. התוצאה המתקבלת היא פחות נקבות מופרות ופחות נזק מזחלי העש. התכשיר עמיד בפני פירוק U.V וכן עמיד, במידה רבה, בפני שטיפה ע"י הגשם ו/או המטרה.



הוראות שימוש

אופן היישום: התכשיר מוכן לשימוש באריזתו המקורית. אין למהול במים.

הערות	מינון (גר/ד')	המזיק	הגידול
ישום נוסף לאחר 12 שבועות*	185	עש התפוח (<i>Cydia pomonella</i>)	תפוח

* או לאחר מספר לכידות רצופות במלכודות הניטור. הראשון מביניהם.

- יש ליישם את התכשיר כאשר צפוייה עלייה ברמת המזיק בשטח (לפני מועד הגיחה של בוגרי עש התפוח במטע, ה-BIOFIX). המועד יקבע לפי ההיסטוריה של תחילת הלכידות בחלקה או לפי ניטור חלקות לא מבוטלות שכנות.
- יש ליישם את התכשיר על גבי ענף בשליש העליון של העץ. מומלץ להניח את הטיפה במקום מוסתר מהשמש. היישום יתבצע בעזרת רובה שפופרות או רחפן ייעודי.
- יש לפזר באופן שווה את טיפות התכשיר בשטח המטופל. משקל הטיפות יהיה בין 1 ל-2.5 גרם ומספר הטיפות על כל עץ יהיה בין 1 ל-2 - בהתאם למספר העצים בדונם.
- יש לפזר בשולי החלקה כמות כפולה של התכשיר. בנוסף יש לפזר את הבלבול גם בשוליים החיצוניים, מעבר לגבולות החלקה.

דוגמא לאופן פיזור התכשיר בחלקה: נפזר "גוש" ספלאט אחד על גבי שני עצים רצופים ונדלג על עץ אחד. בשולי החלקה נפזר 2 "גושים" על כל אחד מהעצים (ללא דילוג), "גוש" אחד בכל צד של העץ. בחלקה עם 120 עצים בדונם משקל הטיפות יהיה 2.3 גרם לטיפה.
(185/80=2.3 gram)

- יעילות הטיפול, בספלאט עש תפוח, בחלקות קטנות מ-50 דונם או בחלקות צרות או משופעות עלולה להיות פחותה. ככל שהאזור המבוטל יהיה גדול יותר כך האפשרות לנזק בפרי מנדידתן של נקבות מופרות יהיה קטן יותר.
- חלקות סמוכות או קירבה לפונדקאים אחרים של העש שלא מטופלים עלולים להוות מקור לנקבות מופרות וכתוצאה מכך ייגרם נזק לפרי במיוחד לאורך הגבולות ובשכנות לחלקות המטופלות.
- השימוש בקוטלי חרקים אחרים לא פוגם בפעילות הבלבול לכן ניתן לרסס בהתאם לצורך.
- ניטור: בגידול המיועד לטיפול בספלאט עש תפוח, יש להציב מלכודות פרומון לניטור הלכידות לפני יישום הפרומון. במשך כל תקופת פעילות התכשיר הלכידה במלכודת הניטור צריכה להיות אפס או קרובה לאפס (תתכן לכידה אקראית מועטה). תחילת לכידה רציפה במלכודות הניטור מסמנת את גמר פעילות התכשיר. במהלך העונה יש לבצע פיקוח רציף לניטור הנגיעות בביצים וחללים של עש התפוח. במקרה של זיהוי נגיעות מומלץ להתייעץ עם אגרונום החברה ו/או המדריך האזורי.**