

SPLAT LOBESIA ספלאט עש אשכול

פרומון לבלבול זכרים של עש האשכול

החומר הפעיל <	(E-Z)-7,9-Dodecadienyl Acetate 3.6%.....
	(E)-7-Dodecenyl Acetate 0.4%
התוארית <	משחה המכילה 4% חומר פעיל
רעילות לאדם <	נמוכה
מסיסות במים <	נמוכה
היצרן <	ISCA Technologies, ארה"ב
מס' הרשוי <	רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 20/הצ/4539

כללי

ספלאט עש האשכול הינו תכשיר המכיל פרומון מין נקבי המיועד לבלבול זכרים של המזיק עש האשכול (*Lobesia botrana*).

באמצעות הפרומולציה הייחודית שלו, התכשיר משחרר את הפרומון בצורה מבוקרת, יוצר אווירה הרוויה בפרומון ומפחית את סיכויי ההזדווגות של המזיק בשטח. התוצאה המתקבלת היא פחות נקבות מופרות ופחות נזק מזחלי העש.

התכשיר עמיד בפני פירוק U.V וכן עמיד, במידה רבה, בפני שטיפה ע"י הגשם ו/או המטרה.

ספלאט עש האשכול SPLAT LOBESIA

הוראות שימוש

אופן היישום: התכשיר מוכן לשימוש באריזתו המקורית. אין למהול במים.

הערות	מינון (גר/ד')	המזיק	הגידול
משך פעילות התכשיר כ-12 שבועות	200	עש האשכול (<i>Lobesia botrana</i>)	גפן

- יש ליישם את התכשיר כאשר צפוייה עלייה ברמת המזיק בשטח. המועד יקבע לפי ההיסטוריה של תחילת הלכידות בחלקה או לפי ניטור חלקות לא מבולבלות שכנות.
- יש ליישם את התכשיר בחלקה העליון של הגפן. מומלץ להניח את הטיפה במקום מוסתר מהשמש. היישום יתבצע בעזרת רובה שפופרות או רחפן ייעודי.
- יש לפזר באופן שווה את טיפות התכשיר בשטח המטופל. משקל הטיפות יהיה בין 1 ל-2.5 גרם בהתאם למספר הגפנים בדונם.
- יש לפזר בשולי החלקה כמות כפולה של התכשיר. בנוסף יש לפזר את הבלבול גם בשוליים החיצוניים, מעבר לגבולות החלקה.

דוגמא לאופן פיזור התכשיר בחלקה: נפזר טיפת ספלאט אחת על כל גפן שנייה לאורך השורה, בכל השורות בכרם.
 בחלקה עם 220 גפנים בדונם משקל הטיפות יהיה 1.8 גרם לטיפה
 (200/110=1.8 gram).

- יעילות הטיפול, בספלאט עש האשכול, בחלקות קטנות מ-50 דונם או בחלקות צרות או משופעות עלולה להיות פחותה. ככל שהאזור המבולבל יהיה גדול יותר כך האפשרות לנזק בפרי מנדידתן של נקבות מופרות יהיה קטן יותר.
- חלקות סמוכות או קירבה לפונדקאים אחרים של העש שלא מטופלים עלולים להוות מקור לנקבות מופרות וכתוצאה מכך ייגרם נזק לאשכולות במיוחד לאורך הגבולות ובשכנות לחלקות המטופלות.
- השימוש בקוטלי חרקים אחרים לא פוגם בפעילות הבלבול לכן ניתן לרסס בהתאם לצורך.
- ניטור: בנידול המיועד לטיפול בספלאט עש האשכול, יש להציב מלכודות פרומון לניטור הלכידות לפני יישום הפרומון. במשך כל תקופת פעילות התכשיר הלכידה במלכודת הניטור צריכה להיות אפס או קרובה לאפס (תתכן לכידה אקראית מועטה). תחילת לכידה רציפה במלכודות הניטור מסמנת את גמר פעילות התכשיר.**
- במהלך העונה יש לבצע פיקוח רציף לניטור הנגיעות בביצים וחללים של עש האשכול. במקרה של זיהוי נגיעות מומלץ להתייעץ עם אגרונום החברה ו/או המדריך האזורי.

