

## אבקה רחיפה להדברת מחלות בירקות, גידולי שדה, מטע ופרחים

**התכולה:** Sulfur 40% + Tetraconazole 1%

**כללי:** דומארק קומבי הינו תכשיר המכיל תערובת של קוטל סיסטמי וקוטל מגע. תערובת זו מאפשרת לתכשיר פעילות מניעה ופעילות מגע. התערובת מפחיתה את סכנת פיתוח העמידות ומתאימה ליישום בתוכנית הדברה משולבת.

מיוצר ע"י: חברת **Isagro**, איטליה  
עבור: **Gowan**, אנגליה  
רשיון השרותים להגנת הצומח  
ולבקורת: 01/הצ/1656

**לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!**  
ليس للاستعمال المنزلي!  
**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**

**דרגת רעילות:** מסוכן (דרגה IV)  
**מספר או"ם:** לא מסווג  
מ'ס אצווה: ראה מודפס על האריזה  
Batch No.: Printed on packing

**ניקוי המרס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכיל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

**בגמר הריסוס:** לאחר הריסוס, רחץ היטב את הידיים ואת כל הגוף במים ובסבון. כבס בנפרד את בגדי העבודה ולבש בגדים נקיים.

**זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס:** 24 שעות. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר היטב בשיטות המקובלות, לפחות 12 שעות נוספות לאחר התייבשות החומר.

**איחסון:** אחסן את התכשיר אך ורק באריזתו המקורית במחסן געול המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

**חומר שנשפך:** תכשיר שנשפך, פג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחיובי בפינוי לאתר הפסולת בנאות חובב. חומר שנשפך, יש להספיג בנסורת או בחול, לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

**טיפול באריזות ריקות:** יש לנער היטב את השאריות שבאריזה לתוך מיכל המרסס ולהשלך את האריזה לאשפה.

**עזרה ראשונה:**

- אם נרטבו בגדי העבודה בתכשיר המרוכז או בתרסיס, הפסק מיד את העבודה, התרחץ במים ובסבון והחלף לבגדים נקיים.
- במקרה של שאיפה העבר את הנפגע למקום מאוורר.
- במקרה של התזה על העור, רחץ את המקום המאולח במים ובסבון. אם מתפתח גרזי פנה מיד לרופא.
- אם ניתז חומר מרוכז או תרסיס **לעניינים** שטוף אותן בזרם מים חלש במשך כ-15 דקות ופנה לרופא.
- בכל פניה לרופא, הצג בפניו את תוית האריזה.

**מידע לרופא:** מרכז למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טלפון: 04-7771900

**הערה:** יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים בשטח. עם כל בטחונו בתכשיר ובאיכותו, אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

התכשיר מיובא ע"י לוכסמבורג תעשיות בע"מ, ת.ד. 13, תל אביב 6100001

**אזהרות:** התכשיר מסוכן בבליעה, יכול לגרום לגרזי בעיניים ובעור.  
**אמצעי זהירות ומיגון:**

- דומארק קומבי הינו חומר הדברה, נהג בו בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בחומרי הדברה. • לבש בגדי עבודה ארוכים, עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער.
- השתמש בכפפות גומי/פולסטיק (לפי תקן EN-374/3) ומשקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) בעת הכנת התרסיס. • המנע משאיפת התכשיר. • מנע מגע התכשיר בעיניים. • המנע ממגע התכשיר בעור.
- המנע מעישון, אכילה ושתייה בזמן השימוש/הטיפול בתכשיר.

**אזהרות לסביבה:** התכשיר אינו רעיל לדבורים.

**הכנת התרסיס:** מדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס, שפך למיכל המרסס המלא בחציו מים, והשלם את כמות המים תוך כדי ערבול.

**הוראות השימוש:**

הגידול	המחלה	ריכוז מיגון (%) (גר/ד')	נפח תרסיס (ל'ד')	מקטיף ימים	הערות
עגבניה	קימחונת	400	20-40	7	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה.
מלון	קימחון	300	40-100	7	יש לרסס כל שבוע ולהקפיד על כיסוי מלא של העלווה.
אבטיח	קימחון	300	20-40	7	יש לרסס כל שבוע ולהקפיד על כיסוי מלא של העלווה. המיגון בהתאם לעוצמת הנגיעות.
קישוא	קימחון	300-450	40-100	7	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה. המיגון בהתאם לעוצמת הנגיעות.
תות שדה	קימחון	300-500	70-100	7	יש לרסס כל שבוע ולהקפיד על כיסוי מלא של העלווה. המיגון בהתאם לעוצמת הנגיעות.
מנגו	קימחון	0.3%	עד נגירה	21	יש לרסס עד נגירה, תוך הקפדה על כיסוי התפרחות.
גפן	קימחון	0.3%	עד נגירה	21	יש להקפיד על כיסוי מלא של האשכולות.
אפרסק, נקטרינה	קימחון	0.3%	עד נגירה	21	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה.
גבסנית	קימחון	300	עד נגירה	-	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה.
כוסברה	קימחון	300	20-40	14	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה.

**הערה:** אין לרסס דומארק קומבי בימי שרב או בשעות החום בימי הקיץ, כאשר הטמפרטורה עולה על 30°C.

**שילובים:** במידה ומשלבים תכשיר נוסף, יש להוסיפו לאחר הכנת תמיסת הריסוס של דומארק קומבי ובהתאם להוראות השימוש המופיעות על התווית שלו: **אבטיח:** ורטימק, מוליט, מוספילן, ספיידר, אויסקט.  
**מלון:** קנון 50, מנקו-די, טלסטאר, ורטימק, אויסקט, מוספילן, ספיידר.  
**תות שדה:** אטברון, פליקטרן, ורטימק, טרייסר אולטרה, פלינט, פולאר, מיתוס.