



רנמן-טופ



לונכסמבורג

להגנה מפני מחלות

להדברת כמשון *Phytophthora infestans* בתפוחי אדמה
מהתכשירים המובילים למניעת כמשון גם בתנאי מזג האוויר
הקשים באירופה

רנמן-טופ מכיל 160 גר/ל של החומר הפעיל Cyazofamid
התכשיר יעיל מאוד במניעת מגוון מחלות עלים מקבוצת האאומיצטים
(כמשון, כשותית וחולי-נופל) מנגנון הפעולה של התכשיר מבוסס על
עיכוב נשימתי המתרחש במיטוכונדריה של הפתוגן ומסווג
ע"י FRAC בקבוצה 21. יש ליישם את התכשיר ביישום מניעתי,
או אחרי יישום טיפול קורטיבי.

מורשה למניעת כמשון בתפוחי אדמה במינון של 50 סמ"ק/ד'

אקלאר ביטא יוג



תכשירינו הנוספים לטיפול במחלות תפוחי אדמה



אוקיו



גלבן מנקוזב



קוסמוס



מנקוזן



מנקו-די



ויטון



לקבלת פרטים נוספים,
סרקו את הקוד

צוות השדה:

נגב: חיים קפלן, 052-246 9552 | עמנואל רוטשילד, 054-431 3949

לכיש, נגב מזרחי, ערבה: תומר שטיין, 052-246 9553

ערבה: עומר דותן, 052-426 0210

שפלה: איתי יוגב, 052-608 0135

חוף כרמל, שרון: מנשה לנג, 052-246 9558

בקעת הירדן, עמק בית שאן ועמק יזרעאל המזרחי: ישראל סוסנוביק, 052-358 2696

גולן, גליל עליון: דור רחמני, 050-962 4878

גליל מערבי ועמק יזרעאל מערב: אביהו פדידה, 054-300 8324

מגזר ערבי: מוחמד ליבנאווי, 052-605 6037

מנהל מוצרי הטעיה ומשיכה: מעין גולני, 052-246 9554 | מנהל תחום מים וטיפול אחר קטיף: אמנון מגנוס, 052-772 8062

מנהל מוצרי הדבקה: דניאל גולצמן, 050-293 3326 | מנהל מחלקה: ד"ר יובל בנימיני, 052-246 9551

מנהל מכירות: עידן שמאי, 053-820 5035 | מנהל מכירות אזור צפון: אבידע אלון, 052-312 7817

רישוי וקשרי לקוחות: אורלי קורבר, 03-796 4329 | מנהל פיתוח מוצרים ישראל: מורן סיטי, 052-342 7521

אקלאט ביאה יוג

לוקסמבורג תעשיות בע"מ

טל: 03-796 4300 www.luxembourg.co.il



לוקסמבורג




רנמן-טופ

רנמן-טופ קוטל מחלות מתוצרת ISK, יפן

מכיל 160 גר/ל של החומר הפעיל Cyazofamid

התכשיר יעיל מאוד במניעת מגוון מחלות עלים מקבוצת האאומיצטים (כמשון, כשותית וחולי-נופל) מנגנון הפעולה של התכשיר מבוסס על עיכוב נשימתי המתרחש במיטוכונדריה של הפתוגן ומסווג ע"י FRAC בקבוצה 21. יש ליישם את התכשיר ביישום מניעתי, או אחרי יישום טיפול קורטיבי.



מאפיינים

- < פעיל כנגד כל שלבי התפתחות הפתוגן במינון של 50 סמ"ק/ד'
- < יעיל כנגד תבדידי כמשון עמידים - אין עמידות צולבת עם קבוצות כימיות אחרות
- < עמיד כנגד שטיפה והמטרה
- < נע לעבר עלים חדשים ומגן עליהם מפני הדבקה מונעת הנבגה על גבי העלווה

התפשטות רנמן-טופ גם לעלווה החדשה


ריכוז ציאזופמיד (רנמן-טופ)




נמוך

גבוה

יום היישום




7 ימים לאחר היישום



רנמן-טופ חודר לעלווה ומשם מתפשט לעבר הצימוח הצעיר לכן יעיל מאוד גם בשלבי הגידול בו העלווה מתחדשת

תוצאות נבחרות מניסויי שדה - מניעת כמשון בתפוחי אדמה באמצעות קוטלי מחלות שונים


פרופ' יגאל כהן - אוניברסיטת בר אילן, 2022



הטיפולים השונים רוסטו פעם אחת בלבד, יומיים לפני אילוח העלווה עם 60 תבדידי כמשון שונים
העמודות מייצגות את השטח מתחת לעקום התפתחות המחלה (AUDPC) 21 ימים לאחר האילוח


ניר עוז 2022

רמת מחלה בעלווה



אחוז שריפת הנוף- 11 ימים אחרי יישום חמישי

רמת יכול פקעות



טון לדונם