

תרכיז מתחלב

קוטל כנימת עש הטבק וזבוב התאנה בגידולים שונים

החומר הפעיל Azadirachtin 12 גרם בליטר <

התוארית תרכיז מתחלב <

רעילות לאדם נמוכה <

היצרן Coromandel International Ltd., India <

מס' הרשוי רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 23/הצ/4683
רשיון לחקלאות אורגנית 7566

כללי

נימזל יעיל על מגוון רחב של חרקים מזיקים לחקלאות ופעיל במגע או כרעל קיבה. התכשיר גורם לדחיית המזיק, מונע אכילה ומפריע בתהליך ההתשנלות. מידת יעילות התכשיר תלויה בתנאי מזג האוויר, לחץ אוכלוסיית המזיק ודרגות התפתחותו. יש לדאוג ליישום התכשיר בכיסוי מלא של העלווה וברמת נגיעות נמוכה ולפני התבססות המזיק בגידול. יש לדאוג לרסס במרווחים של 7-10 ימים בין ריסוס לריסוס.

הוראות שימוש

| ימים מקטיף | נפח תרסיס (ל"/ד') | ריכוז % | פנע | הגידול |
|------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| 3 | 60-20 | 0.25 | כנימת עש הטבק | כרוב, כרובית, ברוקולי |
| | 100-40 | | | חציל |
| 3 | 100-40 | 0.25 | כנימת עש הטבק | עגבנייה |
| | | ⁽¹⁾ 0.25 - 0.125 | טוטה אבסולוטה | |
| 3 | 100-60 | 0.125 | זבוב התאנה | תאנה |

הערות לטבלה

ליישום אופטימלי רסס 2-3 פעמים במרווח של 7-10 ימים ביניהם. ריסוסים בבוקר ובערב הם היעילים ביותר, אין לרסס בשעות החום או על צמחים בעקה. לעיתים עלול גוון העלה להתבהר לאחר היישום של נימזל, תופעה זו חולפת עם התפתחות הצמח.

(1) הריכוז הנמוך מתאים לשימוש בנגיעות התחלתית. לאחר היישום יתכן ויראו מנהרות קטנות על העלוה, מנהרות אלו ישארו קטנות ולא יתפתחו.

שילובים: בעגבניה ניתן לשלב עם פליפר בריכוז 0.5%