

תרכיז רחיף

קוטל מחלות.

החומר הפעיל	Isometamid 400 גר' בליטר
התוארית	תרכיז רחיף
רעילות לאדם	נמוכה
היצרן	ISK, Japan
מס' הרשוי	רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת 22/הצ/4564

כללי

קנג'ה הינו קוטל מחלות צמחים שמנגנון פעילותו הוא עיכוב האנזימים סוקסינט דה הידרו-גינאז (SDHI) האחראי על קומפלקס II במעבר האלקטרונים במיטוכונדריה (FRAC group 7) השימוש הנכון בתכשיר הוא יישום בטיפולי מניעה כנגד גורמי המחלה השונים. על מנת למנוע פיתוח עמידות לתכשיר יש להשתמש בתכשיר מקבוצה כימית אחרת לאחר השימוש בקנג'ה.

טיפול אחרון ימים לפני קטיף	נפח התרסיס (ל"ד)	המינון (סמ"ק/ק"ד) או ריכוז (%)	המחלה	הגידול
3	100-40	100	עובש אפור (בוטריטיס)	מלפפון ⁽¹⁾ , קישוא ⁽²⁾
3	100-30			פלפל ⁽¹⁾ , עגבניה ⁽²⁾ , חציל ⁽²⁾
3	40-20			בזיל ⁽³⁾ , כוסברה ⁽³⁾
7				פטרוזליה ⁽²⁾
8				שמיר ⁽³⁾
-	100-20			גבסנית, כלנית, רוסקוס (עצמוניות)
3	60-30			120
3	30-20	50	חלפת	עגבניה לתעשייה
3	100-30	0.1%		עגבניה בבתי צמיחה
7	140-80	0.15%	עובש אפור (בוטריטיס) עובש שחור (אספרגילוס)	גפן ⁽⁴⁾

הערות לטבלה:

- (1) עד 3 יישומים במרווח של 7 ימים לפחות ביניהם.
- (2) עד 2 יישומים במרווח של 7 ימים לפחות ביניהם.
- (3) יישום בודד.
- (4) עד 2 יישומים במרווח של 10 ימים לפחות ביניהם.