

תרכיז רחיף

קוטל מחלות.

החומר הפעיל Isofetamid 400 גר' בליטר

התוארית תרכיז רחיף

רעילות לאדם נמוכה

היצרן ISK, Japan

מס' הרשוי רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת 22/הצ/4564

כללי

קנג'ה הינו קוטל מחלות צמחים שמנגנון פעילותו הוא עיכוב האנזים סוקסינט דה הידרו-גינאז (SDHI) האחראי על קומפלקס II במעבר האלקטרונים במיטוכונדריה (FRAC group 7) השימוש הנכון בתכשיר הוא יישום בטיפול מניעה כנגד גורמי המחלה השונים. על מנת למנוע פיתוח עמידות לתכשיר יש להשתמש בתכשיר מקבוצה כימית אחרת לאחר השימוש בקנג'ה.

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד') או ריכוז (%)	נפח התרסיס (ל"ד')	טיפול אחרון ימים לפני קטיף
מלפפון ⁽¹⁾ , קישוא ⁽²⁾	עובש אפור (בוטריטס)	100	100-40	3
פלפל ⁽¹⁾ , עגבניה ⁽²⁾ , חציל ⁽²⁾			100-30	3
בזיל ⁽³⁾ , כוסברה ⁽³⁾			40-20	3
פטרוזליה ⁽²⁾				7
שמיר ⁽³⁾				8
גבסנית, כלנית, רוסקוס (עצבעונית)			100-20	-
תות שדה ⁽²⁾		120	60-30	3
תפוח אדמה ⁽¹⁾	חלפת	50	30-20	3
עגבניה לתעשייה				3
עגבניה בבתי צמיחה		0.1%	100-30	3
גפן ⁽⁴⁾	עובש אפור (בוטריטס) עובש שחור (אספרגילוס)	0.15%	140-80	7

הערות לטבלה:

- (1) עד 3 יישומים במרווח של 7 ימים לפחות ביניהם.
- (2) עד 2 יישומים במרווח של 7 ימים לפחות ביניהם.
- (3) יישום בודד.
- (4) עד 2 יישומים במרווח של 10 ימים לפחות ביניהם.