

גרגרים רחפים

קוטל חרקים

Chlorantraniliprole 35%..... < החומר הפעיל

גרגרים רחפים..... < התוארית

נמוכה..... < רעילות לאדם

FMC, United States..... < היצרן

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 23/הצ/4668..... < מס' הרשוי

כללי

אלטקור הינו קוטל חרקים מקבוצת הדיאמידים (מסתייך לקבוצת 28 IRAC). התכשיר מיועד להדברת זחלי עשים במגוון גידולים חקלאיים. התכשיר נקלט בגוף החרק במגע ובבליעה, ונקשר לקולטני Ryanodine פעולה המביאה לשיתוק והפסקת הזנה ולתמותת החרק. התכשיר סלקטיבי למועילים, לדבורי דבש ולדבורי בומבוס. אין ליישם את התכשיר לקרקע בכימיגציה.

הוראות שימוש

הגידול	פגע	ריכוז % או מינון (גר/ד')	נפח תרסיס (ל/ד')	ימים מקטיף
תפוח (1)	עש פרי התפוח	0.01%	150-80	14
אפרסק (2), נקטרינה (2), משמש (2), שזיף (2), שקד (2), דובדבן (2)	עש המשמש (אגרסיה)	0.005%	150-50	7
כותנה	תנשמית האביב (הליותיס)	10 בריסוס קרקע	30-15	14
		10 בריסוס אווירי (5)	10-5	
תירס מתוק (2), תירס מספוא (2)	גדודנית פולשת	10 בריסוס קרקע	30-15	7
		10 בריסוס אווירי (5)	10-5	
כרוב (2), כרובית (3), ברוקולי (3)	עשית המצליבים (עש הכרוביים)	10	40-20	3
עדעד (לימוניות), גבסנית, גרברה	הליותיס	10	60-30	-
אורן	תהלוכן האורן	0.01% - 0.005% בריסוס קרקע (4)	כיסוי מלא	-
		10 גרם בריסוס אווירי (5)	5	-

הערות לטבלה

- (1) שני יישומים בהפרש של 14 ימים לפחות ביניהם.
 (2) יישום בודד בעונה.
 (3) שני יישומים בהפרש של 7 ימים לפחות ביניהם.
 (4) הריכוז הנמוך מתאים לזחלי תהלוכן האורן בדרגות 1-2, הריכוז הגבוה לדרגות 3-4.
 (5) ריסוס אווירי: אין לפזר תכשיר הדברה מכלי טיס (I) מעל בית או במרחק של 120 מטרים ממנו; (II) מעל דרך או במרחק 12 מטרים ממנה; (III) כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המיועד לריסוס לכיוון בית או דרך; כיוון הרוח ייבדק לפני הריסוס ובמהלכו על ידי אבוקת עשן דולקת בשטח.