

קבוצת FRAC: 9 - עיכוב סינתזה של חומצות אמינו וחלבונים

קבוצת FRAC: 12 - מעכב מעבר אותות

תרכיז רחף

קוטל מחלות

Pyrimethanil + Fludioxonil..... < החומר הפעיל

גרגרים תרכיז רחף המכיל 400 גר"/ל' פירימתניל + < התוארית

100 גר"/ל' פלודיוקסוניל

..... < רעילות לאדם בינונית

..... < מסיסות במים גבוהה

ICA International Chemicals (Pty) Ltd., < היצרן

South Africa

..... < מס' הרשוי רישיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 25/הצ/4736

כללי

טוטור מכיל תערובת של שני חומרים פעילים בעלי מנגנוני פעולה שונים למניעת מחלות בצמחים. יש להשתמש בתכשיר בטיפול מניעה או בעת הופעת תסמינים ראשוניים של המחלה. מומלץ להמשיך ולהגן על הצמח כל עוד תנאי מזג האוויר מעודדים מחלה.

הוראות שימוש

הגידול	פנע	המינון (סמ"ק/ד') או ריכוז (%)	נפח תרסיס (ל"ד')	ימים לקטיף
גפן ⁽¹⁾	עובש שחור (אספרגילוס)	0.12%	120-60	14
עגבניה ⁽¹⁾ , מלפפון ⁽¹⁾	עובש אפור (בוטריטיס)	0.2%	80-45	4
חציל ⁽¹⁾				7
קישוא ^(1,2)		150	45-30	7
תות שדה ⁽¹⁾		150	60-20	3
אדמונית		0.25%	100-60	-

הערות לטבלה

- (1) ישום בודד בעונה.
 (2) בקישוא מינון 150 סמ"ק/ד' בנפח ריסוס 30 - 45 ל"ד' או בריכוז 0.2% בנפח ריסוס 45 - 80 ל"ד'.